



Fenix[®]

5 liter

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, løg, ærter med og uden bælg, kartofler, tørrede ærter, bønner og vinterkorn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Skal opbevares tørt og frostfrit.

UN 3082

Reg.nr. 18-417



Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Bayer



DK84995037C

PMR: DK84995037C

Form.: 150x145 mm

Artwork: 9821C

Job no.:

Bayer CropScience DK

Date: 06-07-2026

Country: DK

Colour: **CMYK**

☐ Use only for corrections

☒ Print Ready PDF for
upload to Server

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, løg, ærter med og uden bælgl, kartofler, tørrede ærter, bønner og vinterkorn.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Må i friske ærter med og uden bælgl ikke behandles senere end 70 dage før høst.

Må i kartofler ikke behandles senere end 40 dage før høst.

Ved arbejde i behandlede afgrøder skal der anvendes arbejdstøj (langærmet overdel og bukser).

Sprøjteførere skal anvende arbejdstøj (langærmet overdel og bukser) ved blanding, påfyldning og udbringning.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i gulerødder og løg ved splittdosis på maks 1 + 0,75 + 0,75 L/ha ikke anvendes nærmere end 2 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i løg ved dosis 1,5 - 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i tørrede ærter og friske ærter i vækststadiet 11-30 ved dosis 0,5 – 1 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i kartofler ved dosis 1 – 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i bønner, tørrede og friske ærter og kartofler ved dosis 2 – 2,5 L/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i gulerødder og friske ærter ved dosis 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i vinterkorn ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Skal opbevares køligt, ved eller under stuetemperatur.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og fødestoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.



UFI: R5T0-G00C-D000-NWT9

Virkningsmekanisme

GRUPPE 32 HERBICID

Førstehjælp

Indånding:

Bring personen i frisk luft.

Hud:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

Øjne:

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).

Indtagelse:

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Fenix anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, sætteløg, ærter med og uden bælgt, kartofler, tørrede ærter, bønner og vinterkorn.

Virkemåde

Fenix har både jord- og bladeffekt, og har derfor effekt på både fremspiret og ikke fremspiret ukrudt. Anvendt før fremspiring virker Fenix via kontakt med ukrudtet i fremspiringsfasen. På ukrudt som er fremspiret, optages Fenix gennem blade og stængler. Den synlige effekt på ukrudtet ses ved vækststandsning og gulfarvning af følsomme planter, som efterhånden visner bort.

Sprøjteteknik

Fenix udsprøjtes i 100 – 300 ltr vand pr. ha. Anvend LowDrift dyser, f.eks. Hardi ISO LD-03-110 eller ISO-LD-04-110 med et tryk på 2,0 bar. Efter afgrødens fremspiring anvendes ikke ledsageluft.

Sprøjtetidspunkt

Fenix kan udsprøjtes før eller efter afgrødens og ukrudtets fremspiring, afhængig af afgrøden. Der henvises til doserings- og anvendelsesskemaet.

Blanding med andre midler

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Ved fysik blandbarhed med andre produkter testes der ikke for eventuelle afgrødeskader, nedsat effekt eller andre påvirkninger af afgrøden. Se hjemmesiden www.cropsience.bayer.dk for fysisk blandbare midler eller kontakt din lokale konsulent.

Stort ukrudt i kartofler

Ved stort ukrudt i industri- og spisekartofler, kan der tilsættes et til anvendelsen godkendt glyfosatholdigt produkt. Der behandles inden kartoflerne begynder at gennembyrde jordoverfladen. Denne løsning anvendes ikke i læggekartofler.

Gulerødder

Splitsprøjtning efter fremspiring vil især øge effekten overfor bl.a. sort natskygge. Første sprøjtning skal foretages lige inden gulerødderne folder 1. løvblad ud, og behandlingen skal gentages 8-10 dage senere.

Sætteløg

Fenix kan anvendes tre gange efter sætning ved splitdosis på maksimalt 1 + 0,75 + 0,75 L/ha.

Vinterkorn

Fenix anvendes efter fremspiring fra stadie 10-13 i vinterkorn. Kornet kan maksimalt behandles en gang med 0,58 L/ha. Den optimale effekt opnås når sprøjtesporene er synlige og ukrudtet er småt. Fenix bør anvendes som en del af IPM strategi.

Klimaets betydning

Fenix virker effektivt selv ved lave temperaturer. Optimal effekt og afgrøde skånsomhed opnås ved at behandle med Fenix, når temperaturen er over 10 °C og ingen udsigt til nattefrost. Let regn efter udsprøjtning vil øge jordreffekten af Fenix.

Jordtype og jordflugt

Et bekendt såbed uden store knolde i kombination med god jordflugt giver Fenix optimale virkningsbetingelser.

På svær jord, humus jord eller jorder med højt indhold af organisk materiale vil Fenix give bedst effekt på fremspiret ukrudt. På lette jordtyper bør Fenix altid anvendes i den laveste dosering.

Doserings- og anvendelsesskema

Fenix er et skånsomt, bredspektrret middel, som er effektivt over for ukrudt i en række afgrøder.

I al vinterkorn er Fenix godkendt med 0,58 L/ha til bekæmpelse af græsserne vindaks (74% effekt) og enårig rapgræs (65-75% effekt) samt hyrdetaske (70-85% effekt), burresnerre (85-95% effekt), rød tvetand (70-95% effekt), kamille (50-85% effekt), fuglegræs (85-95% effekt), ærenpris (85-95% effekt) og agerstedmoder (50-85% effekt).

Ved anvendelse af den højeste dosering (2,5 L/ha) før fremspiring i ærter til modenhed, kartofler og hestebønner har Fenix en god effekt på agersennep, knoldet pileurt, markforglemmigøj, valmue, almindelig pengeurt og hyrdetaske.

Ved anvendelse af den højeste dosering (2,5 L/ha) i ærter til modenhed, kartofler og hestebønner efter fremspiring har Fenix en god effekt på burresnerre, hvidmelet gåsefod, ferskenpileurt, almindelig fuglegræs, tvetand og vejpileurt.

Afgrøde	Tidspunkt	Dosering	Max. antal behandlinger/år	Maks. dosering/år	Bemærkninger
Vinterkorn (hvede, tritcale, rug og byg)	Efter fremspiring	0,58 L/ha	1	0,58	Anvendes i efteråret når kornet har 1-3 blade (BBCH 10-13)
Markærter til modenhed	Før fremspiring	2,5 L/ha	1	2,5	Max. samlet dosering i markærter til modenhed er 2,5 L/ha.
Markærter med bæg (inkl. ærter til frost og konserver)	Før fremspiring	2,0 L/ha	1	2,0	Max. samlet dosering i ærter med bæg er 2,0 L/ha.
Markærter samt ærter med bæg (inkl. ærter til frost og konserver)	Efter fremspiring, ærter 5-8 cm høje <i>eller</i> 1. beh. på kimbladstadiet, 2. beh. 7-10 dage senere	0,75-1,0 L/ha 2 x 0,5 L/ha	1 2	1,0	Højeste dosering på lerholdige jorde mod kamille, burresnerre, pileurt og enårig rapgræs
Kartofler, industri og konsum	Umiddelbart før fremspiring når kammen har lagt sig	1,5-2,5 L/ha	1	2,5	Ved stort ukrudt samt fremspirede kamiller, hanekro og stedmoder kan der tilsættes et godkendt glyfosatholdigt produkt
Kartofler, lægge	Umiddelbart før fremspiring når kammen har lagt sig	1,5-2,5 L/ha	1	2,5	Behandling 5-7 dage før fremspiring eventuelt i blanding med et godkendt clomazonholdigt produkt.
Hestebønner	Før fremspiring	2,0-2,5 L/ha	1	2,5	Laveste dosering på let jord samt når der sprøjtes på fugtig jord
Gulerodder, enkelt behandling	Før fremspiring	2,0 L/ha	1	2,0	På veltillavet såbed og fugtig jord
Gulerodder, delt beh.	Før fremspiring Efter fremspiring	1,0 L/ha 2. og 3. beh.: 0,5-0,75 L/ha	3	2,5	1. beh. på fugtig jord før fremspiring. 2. beh. på småt ukrudt. 3. beh. 8-10 dage senere
Sætteløg	1. behandling 2. behandling 3. behandling	1,0 L/ha 0,5-0,75 L/ha 0,5-0,75 L/ha	3	2,5	1. beh. på fugtig jord efter sætning 2. beh. på småt ukrudt. 3. beh. 8-10 dage senere

BEMÆRK!

Anvendes Fenix på humusjord for afgrødens fremspiring, vil kun fremspire ukrudt blive bekæmpet tilfredsstillende. Generelt opnås den bedste effekt ved at udføre Fenix behandlingen på fugtig/ våd jord.

Efterfølgende afgrøde

Året efter anvendelse af Fenix kan der sås alle afgrøder. Ved etablering af vinterkorn efter anvendelse af Fenix i vårsæde afgrøder, anbefaler vi en grundig jordbehandling for eksempel pløjning. Hvis der sås vinterraps eller roer anbefales pløjning inden såning.

Omsåning af afgrøde

Hvis en afgrøde skal omsås, må der ikke sås, plantes rødder, knolde, løg, stængelgrøntsager eller kartofler før 120 dage efter anvendelse af Fenix.

Ved omsåning af en afgrøde, som er behandlet med Fenix kan der sås korn efter en grundig jordbehandling for eksempel pløjning.

Hvis Fenix har været anvendt i vinterkorn som udvinter kan der om foråret sås korn eller majs efter en grundig jordbehandling.

Fremstilling af sprøjtetasken

Fenix skal omrystes/omrøres før brug.

Kemikalierne tilsættes i sprøjten fyldestyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldestyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtetasken under transport og udsprøjtning.

Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og brillen.

Resistens

Fenix indeholder aktivstoffet aclonifen, der til hører HRAC gruppe 32: Inhibering af carotenoid biosyntesen (ukendt virkningssted).

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Desuden anbefales det at anvende kulturtekniske metoder, som pløjning, sædskifte mm. for at dæmpe ukrudstrykket og modvirke resistenudvikling.

Produktmæssige begrænsninger

Fenix kan under visse omstændigheder gulfarve behandlede afgrøder. Afgrøderne vokser hurtigt fra det, og udbytte og kvalitet påvirkes normalt ikke. Især under følgende forhold optræder gulfarvning/af-farvning:

- Hvis der umiddelbart efter Fenix behandlingen kommer kraftig nedbør.
- Hvis der behandles i forbindelse med nattefrost.
- Når afgrøden behandles, netop når jordskorpen brydes.
- Når afgrøden umiddelbart efter behandling dækkes med plastik.
- Når afgrøder, der har været dækket af plastik, behandles, inden de når at danne vokslag.
- Der må ikke sås/plantes rødder og knolde, løg, stængelgrøntsager og kartofler før 120 dage efter anvendelse af Fenix.

Rengøring af sprøjtetstyr

Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten.

Hvis udvendig rengøring ikke finder sted på det behandlede areal, inden dette forlades, skal sprøjte eller traktor opstilles på et areal med tæt belægning med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder, f.eks. en vaskeplads, eller under tag, indtil rengøring kan finde sted. Restsprøjtetasken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel.

Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtetasken.

Emballagen må ikke genbruges.

PRODUKTANSVAR

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

Ukrudtsmiddel nr. 18-417

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidlefforordningen 1107/2009.

Analyse

Aclonifen 600 g/l (49,6% w/w)

Indeholder aclonifen og benzisothiazolinon (BIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Netto 5 liter

Flydende

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Fabr.nr./Produktionsdato: se pakningen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdatoen er påtrykt emballagen.

6.2026

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Bayer

Vejledning for mindre anvendelse af Fenix (18-417) mod ukrudt i kartofler efter fremspiring på arealer med behov for opfølgende sprøjtning fx hvis kammen er skyllet ned.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes mod ukrudt i kartofler efter fremspiring på arealer hvor der er behov for opfølgende sprøjtning fx hvis kammen er skyllet ned, og nyt ukrudt er spiret frem.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes
- Dosering for denne mindre anvendelse og den samlede dosis på 2,5 L/ha pr. vækstår skal overholdes
- Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning.
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter
- Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.

Advarsel:

"Se Fenix etiketten".

Brugsanvisning: Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Vandmængde	Behandlingstidspunkt (vækststadier)
Kartofler	Tokimbladet ukrudt	1.behandling 0,25 L/ha 2.behandling 0,25 L/ha I alt max. 2,5 L/ha pr. år på samme areal*	2 (mindst 7 dage)	100-300 L/ha	1.behandling: ca. 7-10 dage efter fremspiring 2.behandling: ca. 7-10 dage efter første behandling efter fremspiring

* Der må maksimalt være anvendt 2 L/ha før fremspirring

Sprøjteteknik: Marksprøjte (bomsprøjte)

Risiko for skade: Fenix efter fremspiring giver lidt bladsvidninger, som dog kun medfører en beskeden risiko for negativ påvirkning af udbyttet. Fenix bør ikke anvendes i læggekartofler efter fremspiring.



Fenix[®]

5 liter

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, løg, ærter med og uden bælg, kartofler, tørrede ærter, bønner og vinterkorn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Skal opbevares tørt og frostfrit.

UN 3082

Reg.nr. 18-417



Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Bayer



DK84995037C

5 705628 253245

Fenix[®]

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, løg, ærter med og uden bæl, kartofler, tørrede ærter, bønner og vinterkorn.

Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Må i friske ærter med og uden bæl ikke behandles senere end 70 dage før høst.

Må i kartofler ikke behandles senere end 40 dage før høst.

Ved arbejde i behandlede afgrøder skal der anvendes arbejdstøj (langærmet overdel og bukser).

Sprøjteførere skal anvende arbejdstøj (langærmet overdel og bukser) ved blanding, påfyldning og udbringning.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i gulerødder og løg ved splitdosis på maks 1 + 0,75 + 0,75 L/ha ikke anvendes nærmere end 2 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i løg ved dosis 1,5 - 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i tørrede ærter og friske ærter i vækststadiet 11-30 ved dosis 0,5 - 1 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i kartofler ved dosis 1 - 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i bønner, tørrede og friske ærter og kartofler ved dosis 2 - 2,5 L/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i gulerødder og friske ærter ved dosis 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Må i vinterkorn ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbi passerende.


Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Skal opbevares køligt, ved eller under stuetemperatur.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.



Førstehjælp: se brugsanvisningen

Ukrudtsmiddel nr. 18-417

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

Aclonifen 600 g/l (49,6% w/w)

Indeholder aclonifen og benzisothiazolinon (BIT).

Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Netto 5 liter

Flydende

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Fabr.nr./Produktionsdato: se pakningen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdatoen er påtrykt emballagen.

Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Tlf. 45 23 50 00

www.cropscience.bayer.dk

Bayer

PMR: DK84990574C

Bayer CropScience DK

Form.: 150x145 mm

Artwork: 9820E

Job no.: 34-4309/2790

Date: 11-06-2026

Country: DK

Colour: **CMYK**

☐ Use only for corrections

☒ Print Ready PDF for
upload to Server