

Efterårsløsninger mod ukrudt i vintersæd 2026

Tabel 1 Relevante midler til efterårsbrug (priser er opdateret aug 2026)

| Middel              | God mod især                                                                             | Pris - niveau* | Produkter med samme indhold                       | Forbehold                                                                                                                                              | Afstand til - vand - § 3 -veje m.m.               | Resi-stens-klasse |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Adimax              | Rajgræs                                                                                  | 270 kr./l      |                                                   | Kun godkendt i hvede. OBS 75 % afdrift-reduktion                                                                                                       | - 10 m<br>- 0 krav<br>- 0 krav                    | N/15 + A/1        |
| Boxer               | Effekt på de fleste græsarter                                                            | 190 kr/l       | Boxer 800 EC, Fidox EC, Roxy EC, LFS-prosulfocarb | Boxer :Max 1 gang pr sæson.<br><br>For de andre: Der må ikke bruges andre Prosulfocarb-midler<br>For alle: Krav om <i>mindst</i> 75 % afdriftreduktion | - 10 m<br>- 0 krav<br>- 0 krav                    | N/15              |
| DFF**               | Enårig rapgræs, ærenpris, stedmoder                                                      | (450 kr/l)     | Diflanil 500 SC **, Legacy 500 SC **, Sempra SC** | Max 1 gang pr sæson.                                                                                                                                   | - 10 m –<br>- 0 krav<br>- 0 krav                  | F1/12             |
| Fenix               | Bedste alternativ til DFF/ Mateno Duo mod enårig rapgræs, (kamille)                      | 475 kr/l       |                                                   | Max 1 gang pr sæson<br><br>Ved brug af middel med gammel etikette, skal man have en ny liggende.                                                       | -10 m<br>- 5 m<br>- 2 m                           | S/32              |
| Mateno Duo SC 600** | Enårig rapgræs, vindaks, storkenæb, raps, kamille, kornblomst, nogen effekt på væselhale | (475 kr/l)     |                                                   | Max 1 gang pr sæson.<br><br>Må ikke blandes med Boxer i rug og byg                                                                                     | 20 m (10 m ved max 0,35 l/ha) –<br>- 5 m<br>- 2 m | F1/12 + S/32      |
| Pico 750 WG         | Fuglegræs, stedmoder, tvetand, ærenpris (kamille)                                        | 2,5 kr/g       |                                                   | Godkendt i st 11-12 om efteråret (eller st 25-29 om foråret). Kun blanding med Boxer i hvede anbefales af BASF                                         | -20 m<br>- 0 krav<br>- 2 m                        | S/12              |
| Topik EC            | Rajgræs, vindaks, (agerrævehale)                                                         | 740 kr/l       |                                                   | Ikke i vinterbyg                                                                                                                                       | -2 m<br>-0 krav<br>-0 krav                        | A/1               |

\*Pris fra Middeldatabasen.dk  
\*\* Midlet er udgået, restlagre må opbevares og bruges indtil d.1/12 i år

**Tabel 2** Løsninger til **TIDLIGT SÅET hvede, rug og triticale**. Vi anbefaler ikke tidlig såning (før 15.-9.) af vinterbyg. Ukrudt med 0-2 blade. NB begrænsninger for brug af flere midler i rug ses under ”bemærkninger”.

| Løsning                                 | Ukrudtsarter<br>Fed skrift:<br>Sikker effekt                                                                                                  | St. 8-9<br>(3-5 dage<br>efter<br>såning).<br>Dosis/ha | St. 10-11<br>(10-12<br>dage<br>efter<br>såning.<br>Dosis/ha | St. 12-13<br>(når nyt<br>ukrudt er<br>fremme.<br>Dosis/ha | Kemi-<br>pris,<br>kr/ha                               | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | <b>Fuglegræs,<br/>hyrdetaske,<br/>stedmoder,<br/>tvetand,<br/>ærenpris,<br/>burresterre<br/>m.fl samt<br/>enårig<br/>rapgræs,<br/>vindaks</b> | I: 0,075-0,1<br>I DFF/<br>Legacy 500                  |                                                             | II: 0,75 l<br>Boxer                                       | 175-185                                               | Begge midler max 1 gang pr sæson<br><br>II: Husk afdrift reduktion                                                                                                                                                                                                                |
| 1A, uden<br>DFF/Legacy                  |                                                                                                                                               |                                                       | I:-1-1,25 l<br>Boxer +<br>0,3 l Fenix                       | II: 20-40 g<br>Pico 750<br>WG<br>(senest st.<br>12)       | 385-480                                               | Fenix og Boxer max 1 gang pr sæson<br>I: Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke er ”Boxer-vejr” i st. 10-11, startes med 0,58 Fenix. Boxer kan blandes med Pico i hvede<br><br>II: Da Pico næsten kun har bladeffekt, behandles når mest muligt ukrudt er spiret - men stadig småt |
| 2                                       | Som løsning 1 samt:<br><b>kamille,<br/>raps,<br/>storkenæb,<br/>kornblomst,<br/>alm.<br/>brandbæger.</b>                                      | I: 0,35*-0,5<br>I Mateno<br>Duo SC 600                |                                                             | II: 0,75 l<br>Boxer                                       | 310-380                                               | Begge midler max 1 gang pr sæson<br><br>I: I rug afventes kornets grønne farve før behandling med Mateno Duo. Max dosis 0,35 l<br><br>II: Husk afdrift-reduktion                                                                                                                  |
| 2A, uden<br>DFF/Legacy<br>Mateno<br>Duo |                                                                                                                                               |                                                       | I: 0,75-1 l<br>Boxer +<br>0,4 l Fenix                       | II: 40-60 g<br>Pico 750<br>WG<br>(senest st<br>12)        | 435-530                                               | Fenix og Boxer max 1 gang pr sæson<br>I: Husk afdrift-reduktion Hvis det ikke er ”Boxer-vejr” i st. 10-11, startes med 0,58 Fenix. Boxer kan blandes med Pico i hvede<br><br>II: Da Pico mest har bladeffekt, behandles når mest muligt ukrudt er spiret- men stadig småt         |
| 3                                       | Som løsning 1 +<br>rajgræs (ikke<br>reststente)                                                                                               | I: 0,1 l DFF/<br>Legacy 500                           | II: 1,5 -<br>1,75 l<br>Boxer                                |                                                           | 330-380<br>+ evt.<br>beløb til<br>opfølg-<br>ning     | Bemærkninger som for løsning 1 samt:<br><br>Der kan følges op mod rajgræs med Topik EC (efterår) eller med Cossack OD (forår) mod rajgræs, der ikke er SU/ALS-resistent                                                                                                           |
| 3-4 A, uden<br>DFF/Legacy               |                                                                                                                                               |                                                       | I: 1,5 l<br>Boxer +<br>0,58 l<br>Fenix                      | II: 20-40 g<br>Pico 750<br>WG<br>(senest st.<br>12)       | 610-710<br><br>+ evt.<br>beløb til<br>opfølg-<br>ning | Bemærkninger som for løsning 1A samt:<br><br>Der kan følges op mod rajgræs med Topik EC (efterår) eller med Cossack OD (forår) mod rajgræs, der ikke er SU/ALS-resistent                                                                                                          |
| 4                                       | Som løsning 2 + rajgræs<br>(ikke<br>resistente)                                                                                               | I: 0,35*-0,7<br>l/ha<br>Mateno<br>Duo SC 600          | II: 1,5-<br>1,75 l<br>Boxer                                 |                                                           | 450-665<br><br>+ evt.<br>beløb til<br>opfølg-<br>ning | Bemærkninger som for løsning 2 samt:<br><br>Der følges op med Topik EC (efterår) eller Cossack OD (forår) mod rajgræs (hvis det ikke SU/ALS-resistent)                                                                                                                            |

Tabellen fortsætter på næste side.

|                     |                                                                                             |                                        |                                |                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                   | Som løsning 2 samt:<br><b>rajgræs</b> , alm./ital., +/- resistens, væselhale, ager-rævehale | I: 0,35*-0,7 l/ha<br>Mateno Duo SC 600 | II: 1,5 - 1,75 l Boxer         | III: Hvede: 0,7-1 l<br>Adimax + 0,5 l olie<br><br>Rug og tritcale: 0,2 l Topik EC + 0,5 l olie | 640-890  | <p>Alle midler må max. bruges 1 gang pr. sæson</p> <p><b>I: I rug afventes kornets grønne farve før behandling med Mateno Duo. Max dosis 0,35 l</b></p> <p><b>II:</b> Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke er ”Boxervejr” i st. 10-11, udsættes Boxer til st. 12, hvor det kan blandes med Topik og olie. Højeste dosis mod væselhale</p> <p><b>III:</b> Aktuelt ved store mængder grove græsser. Der behandles på småt græs, med max 1 blad. OBS sprøjteteknik<br/>Der kan opfølges med Cossack OD eller lignende til foråret, mod (ikke-resistente) rajgræs m.m.<br/>Adimax (kun i hvede, hvor der ikke er brugt ”Produkter med samme indhold” som Boxer, fra tabel 1) er bedst mod væselhale<br/>Topik er bedst mod agerrævehale</p> |
| 5A, uden Mateno Duo |                                                                                             |                                        | I: 1,5 -2 l Boxer + 0,58 Fenix | II: 40-60 g Pico 750 WG senest st. 12 +<br>III: 0,2 l Topik EC + 0,5 l olie senest st 13       | 830-1075 | <p>Fenix, Boxer og Topik må max. bruges 1 gang pr. sæson</p> <p><b>I:</b> Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke er ”Boxervejr” i st 10-11 udsættes Boxer til st. 12, hvor det i hvede kan blandes med Pico, i rug og tritcale med Topik . Højeste Boxer-dosis mod væselhale og ager-rævehale.</p> <p><b>II- III:</b> Begge behandlinger effektive på småt ukrudt. Blanding af midlerne frarådes af BASF</p> <p><b>III:</b> I hvede kan Topik erstattes med Adimax under visse forudsætninger-som under løsning 5</p>                                                                                                                                                                                                                     |

\*Max dosis i rug

**Tabel 3** løsninger til **hvede/rug/triticale**, **sået efter ca. 15.-9.** Moderat ukrudtsbestand, ukrudt med 0-2 løvblade.  
Begrænsninger for brug af flere midler i rug ses under ”bemærkninger”.

| Løsning                                            | Ukrudtsarter.<br>Fed skrift:<br>Sikker effekt                                                                                                 | St. 8-9<br>(3-5 dage<br>efter<br>såning)<br>Dosis/ha | St. 10-11<br>(2-3 uger<br>efter<br>såning)<br>Dosis/ha               | St. 12-13<br>(når nyt<br>ukrudt er<br>fremme)<br>Dosis/ha | Kemi-pris<br>kr./ha                              | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | <b>Fuglegræs,<br/>hyrdetaske,<br/>stedmoder,<br/>tvetand,<br/>ærenpris,<br/>burresterre<br/>m.fl samt<br/>enårig<br/>rapgræs,<br/>vindaks</b> | <b>I:</b> 0,075-<br>0,1 l<br>DFF/Legacy<br>500       |                                                                      | <b>II:</b> 0,75 l<br>Boxer                                | 175-185                                          | Midlerne må bruges max 1 gang pr sæson<br>Blanding af midlerne foretrækkes, hvis man er ret sikker på at kunne færdes i st. 10-11<br><br><b>II:</b> Husk afdrift-reduktion                                                              |
| 1A,<br>uden<br>DFF/<br>Legacy                      |                                                                                                                                               |                                                      | <b>I:</b> 1 l Boxer<br>+ 0,3 l<br>Fenix                              | <b>II:</b> 20-40 g<br>Pico 750 EC<br>(senest st<br>12)    | 385-435                                          | Fenix og Boxer må max. bruges 1 gang pr sæson<br><br><b>I:</b> Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke ”Boxer-vejr” i st. 10-11, udbringes 0,58 Fenix alene da. Boxer kan blandes med Pico i hvede                                        |
| 2                                                  | Som løsning 1 +<br><b>kamille, raps,<br/>storkenæb,<br/>kornblomst,<br/>alm.<br/>brandbæger</b>                                               |                                                      | 0,5 l Boxer<br>+<br>-0,35*- 0,5<br>l Mateno<br>Duo SC 600            |                                                           | 260-333                                          | <b>I rug afventes kornets grønne farve før behandling med Mateno Duo. Max dosis 0,35 l. Midlerne bruges hver for sig</b><br><br>Bemærkninger i øvrigt som for løsning 1                                                                 |
| 2A,<br>uden<br>Mateno<br>Duo                       |                                                                                                                                               |                                                      | <b>I:</b> 0,75 l<br>Boxer +<br>0,58 l Fenix                          | <b>II:</b> 40-60 g<br>Pico 750 EC<br>(senest st<br>12)    | 520-570                                          | Fenix og Boxer må max. bruges 1 gang pr sæson<br><br><b>I:</b> Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke ”Boxer-vejr” i St. 10-11, udbringes Fenix alene da. Boxer kan blandes med Pico i hvede                                             |
| 3                                                  | Som løsning 1 +<br>rajgræs (ikke<br>reststente)                                                                                               |                                                      | 1,5 - 1,75 l<br>Boxer<br>+0,05 -<br>0,075 l DFF<br>/Legacy<br>500 SC |                                                           | 320-365<br><br>+ evt. beløb<br>til<br>opfølgning | Bemærkninger som for løsning 1 samt:<br>Blandingen er ret hård, nedsæt DFF til ca. 0,05 l/ha i rug, der nemt svides .<br><br>Der kan følges op mod rajgræs med Topik EC eller Cossack OD mod rajgræs, hvis det ikke er SU/ALS-resistent |
| 3-4 A,<br>uden<br>DFF/<br>Legacy/<br>Mateno<br>Duo |                                                                                                                                               |                                                      | <b>I:</b> 1,5 l<br>Boxer + 0,4<br>l Fenix                            | <b>II:</b> 20-60 g<br>Pico 750<br>WG                      | 525-625<br><br>+evt. beløb<br>til<br>opfølgning  | Bemærkninger som for løsning 1 samt:<br><br>Der kan følges op mod rajgræs med Topik EC eller Cossack OD mod rajgræs, hvis det ikke er SU/ALS-resistent.                                                                                 |
| 4                                                  | Som løsning 2<br>+ rajgræs (ikke<br>resistente)                                                                                               |                                                      | <b>I:</b> 1 l Boxer<br>+ 0,35*-0,7<br>l Mateno<br>Duo SC 600         |                                                           | 355-525<br><br>+ evt. beløb<br>til foråret       | Bemærkninger som for løsning 2 samt:<br><br>Der kan følges op med Topik EC (efterår) eller Cossack OD (forår) mod rajgræs, hvis det ikke SU/ALS-resistent.                                                                              |

|                             |                                                                                           |  |                                                              |                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                           | Som løsning 2 +<br><b>rajgræs, alm/ital (+/- resistens)</b><br>ager-rævehale, væselhale , |  | I: 1,5 l/ha<br>Boxer + 0,35* - 0,7 l/ha<br>Mateno Duo Sc 600 | II: Hvede: 0,8-1 l<br>Adimax + 0,5 olie<br><br>Rug og tritcale: 0,2 l Topik EC + 0,5 l olie                                                | 630-910 | Alle midler må max. bruges 1 gang pr. sæson<br><br><b>I: I rug afventes kornets grønne farve før behandling med Mateno Duo. Max dosis 0,35 l. Midlerne bruges hver for sig</b><br><b>I:</b> Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke er ”Boxervejr” i st. 10-11, udsættes Boxer til st. 12, hvor det kan blandes med Topik og olie<br><br><b>II:</b> Aktuelt ved store mængder grove græsser. Der behandles på småt græs, med max 1 blad. OBS sprøjteteknik: god dækningsgrad. Der kan opfølges med Cossack OD eller lignende til foråret, mod (ikke-resistente) rajgræs m.m.<br>Adimax: kun i hvede, hvor der ikke er brugt ”Produkter med samme indhold” som Boxer, fra tabel 1.Højeste dosis mod væselhale. Topik er bedst mod agerrævehale. |
| 5 A, uden DFF/Legacy/Mateno |                                                                                           |  | I: 1,5 Boxer + 0,4 Fenix                                     | II: 40-60 g Pico 750 WG senest st 12<br><br>III: Hvede: 0,8-1 l<br>Adimax + 0,5 l olie<br><br>Rug og tritcale: 0,2 l Topik EC + 0,5 l olie | 745-915 | Bemærkninger som under 1 A<br><br><b>II:</b> Højeste Pico-dosis hvis meget bredbladet ukrudt.<br><br><b>III:</b> Aktuelt ved store mængder grove græsser. Der behandles på småt græs, med max 1 blad. OBS sprøjteteknik. Der kan opfølges med Cossack OD eller lignende til foråret, mod (ikke-resistente) rajgræs m.m.<br><br>Adimax: kun i hvede, hvor der ikke er brugt ”Produkter med samme indhold” som Boxer, fra tabel 1.Højeste dosis mod væselhale. Topik er bedst mod agerrævehale                                                                                                                                                                                                                                                 |

\*Max dosis i rug

**Tabel 4.** Løsninger til **Vinterbyg**. Moderat ukrudtsbestand, såtid efter 15./9. Ukrudt med 0-2 løvblade.

| Løsning            | Ukrudtsarter. Fed skrift: Sikker effekt                                                                   | St. 10-11<br>Ca. 2 uger efter såning<br>Dosis/ha | St. 11-12<br>Når nyt ukrudt er fremme<br>Dosis/ha | Kemipris<br>kr/ha                  | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | <b>Fuglegræs, hyrdetaske, stedmoder, tvetand, ærenpris, burresnerre m.fl samt enårig rapgræs, vindaks</b> | 0,075 l/ha<br>DFF/Legacy 500 + 0,75 Boxer 800 EC |                                                   | 175                                | Begge midler max. 1 gang pr. sæson. Husk afdrift - reducerende teknik. Ved tidlig såning kan DFF bruges 3-5 dage efter såning og Boxer 10-14 dage senere. Begge i lidt højere dosis                                                            |
| 1A Uden DFF/Legacy |                                                                                                           | I:0,75l<br>Boxer                                 | II: 20-30 g<br>Pico WG                            | 195-240                            | Boxer max. 1 gang pr. sæson<br><br><b>I:</b> Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke ”Boxer-vejr” i st. 10-11, udbringes Fenix alene da. Boxer bør ifølge BASF ikke blandes med Pico i byg                                                       |
| 2                  | Som løsning 1 + <b>storkenæb, kornblomst, kamille</b>                                                     | I: 0,35 l<br>Mateno Duo SC 600                   | II: 0,75 l<br>Boxer 800 EC                        | 305                                | Begge midler max. 1 gang pr. sæson<br><br>Bland ikke midlerne i byg<br><br><b>II:</b> Husk afdrift-reduktion.                                                                                                                                  |
| 2A Uden Mateno Duo |                                                                                                           | I: 0,75 l<br>Boxer 800 EC + 0,3 l Fenix          | II: 20-40 g<br>Pico 750 WG                        | 385-435                            | Boxer og Fenix max. 1 gang pr. sæson<br><br><b>I:</b> Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke ”Boxer-vejr” i St. 10-11, udbringes Fenix alene da. Boxer bør ifølge BASF ikke blandes med Pico i byg                                              |
| 3                  | Som 2 + <b>rajgræs</b> væselhale dæmpes                                                                   | I: 0,35 l/ha<br>Mateno Duo SC 600                | II: 1,75-2 l/ha<br>Boxer                          | 495-540<br><br>+ beløb til foråret | Bemærkninger som for løsning 2 samt:<br><br>Der følges op med Hussar Plus OD til forår (mod ikke-resistent græs)<br>Mod SU/ALS-resistent rajgræs: ingen muligheder for opfølgning                                                              |
| 3A Uden Mateno Duo |                                                                                                           | I: 1,25 l<br>Boxer 800 EC + 0,58 l Fenix         | II: 40-60 g<br>Pico 750 WG                        | 610-660<br><br>+ beløb til foråret | Bemærkninger som for løsning 2A samt:<br><br><b>II:</b> Højeste dosis ved meget bredbladet ukrudt<br><br>Der følges op med Hussar Plus OD til forår (mod ikke-resistent græs)<br>Mod SU/ALS-resistent rajgræs: ingen muligheder for opfølgning |