

Tabel 1 Ukrudtsmidler i majs. Godkendelser, max. doseringer og andre bestemmelser, samt "vejledende" pris.

Aktivstof	Middel	Behandlingsfrist, afgrødestadium	Max. dosis [g, kg, L / ha] m.v.	Afstand til [m]			Pris [kr. pr. g, kg, L]
				Vand-miljø	§3	Beboelse, veje m.v.	
Bentazon	Benta 480 SL	2 uger	1,0 L ved én behandling; 0,9 L (0,4 L + 0,5 L) ved splitbehandling	2	--	--	--
	Fighter 480	2 uger	1,0 L ved én behandling; 0,9 L (0,4 L + 0,5 L) ved splitbehandling	2	--	--	210
Diflufenican	DFF/Legacy 500 SC ¹⁾	Inden afgrødens fremspiring	0,075 L. Kun én behandling pr. år.	10	--	--	392
Fluroxypyr	Flurostar 180	Vækststadium 13-16 (3-6 blade)	0,3 L. Max. én behandling pr. vækstsæson.	2	--	--	152
	Starane 333 HL	90 dage, vækststadium 13-16 (3-6 blade)	0,15 L. Max. én behandling pr. vækstsæson.	2	5	--	265
	Tomahawk 200 EC	Vækststadium 13-16 (3-6 blade)	0,3 L	--	--	--	245
Foramsulfuron m. fl.	LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen	75 dage	150 g. Max. to behandlinger pr. år	10	--	--	--
	MaisTer	75 dage, senest i vækststadium 18 (8 blade)	150 g. Max. to behandlinger pr. år.	10	--	--	2,55
Mesotrion	ATR Mesotrion 100 SC	Vækststadium 12-19 (2-9 blade)	1,5 L. Max to behandlinger (2 x 0,75 L) pr. år.	2	10	2	220
	Border 100 SC	Vækststadium 11-18 (1-8 blade)	1,5 L. Op til tre behandlinger (3 x 0,5 L) pr. år.	2	20	2	275
	Callisto	90 dage Vækststadium 11-18 (1-8 blade)	1,5 L. Op til tre behandlinger (3 x 0,5 L) pr. år.	2	20	--	225
	Evolya	Vækststadium 12-19 (2-9 blade)	0,3 kg. Op til tre behandlinger (3 x 0,1 kg/ha) pr. år.	2	10	--	990
	LFS Mesotrion (Ikke længere markedsført, godkendt indtil 31/5/2033)	90 dage Vækststadium 11-18 (1-8 blade)	1,5 L. Op til tre behandlinger (3 x 0,5 L) pr. år.	2	20	--	--
	Lumica	90 dage Vækststadium 11-18 (1-8 blade)	1,5 L. Op til tre behandlinger (3 x 0,5 L) pr. år.	2	20	--	225
	Meristo	90 dage Vækststadium 11-18 (1-8 blade)	1,5 L. Op til tre behandlinger (3 x 0,5 L) pr. år.	2	20	--	225
	Starship Max	Vækststadium 12-19 (2-9 blade)	1,5 L. Op til to behandlinger (2 x 0,75 L) pr. år.	2	10	2	225

	Temsa SC	Vækststadium 12-18 (2-8 blade)	1,5 L	2	5	2	--
	Tocalis	Vækststadium 12-19 (2-9 blade)	0,3 kg. Max. tre behandlinger (3 x 0,10 kg) pr. år	2	10	--	990
Pendimethalin	Stomp CS	3 måneder. Før fremspiring indtil vækststadium 13.	1,0 L. Max. én behandling pr. sæson.	20	--	--	320
Pyridat	Onyx	Vækststadium 12-16 (2-6 blade)	0,6 L: Én behandling pr. år; 2 x 0,5 L: To behandlinger pr. år.	20	--	2	330
Thifensulfuron- methyl	Harmony 50 SX	2 måneder. Vækststadium 13-16 (3-6 blade)	5,6 g. Max. én behandling pr. år.	10	--		6,65

- 1) DFF/Legacy 500 SC har en off label godkendelse – nu kaldet "minor use" – til anvendelse i majs før fremspiring. Du finder den her. Link til tidligere udgave af TG. <https://publikationer.sagro.dk/tilvaekst-grovfoder-2022/tilvaekst-grovfoder-nr-8-29-april-2022/#aktuelt-i-majs>