

Tabel 4 Standardløsninger til bekæmpelse af **almindelig ukrudtsbestand**, samt **hejre- og storkenæb** i majs på ukrudt med **max. to løvblade**. **Tocalis / Evolya (500 g-vare)**

Løsning		Dosis [L/g/pr. ha]	Pris ¹⁾ [kr. pr. ha]	Ukrudtsbestand og bemærkninger	
Almindelig ukrudtsbestand					
T1 Første bladsprøjtning. Almindelig ukrudtsbestand – max. to løvblade					
1	1.	Tocalis Harmony 50 SX Renol ²⁾	0,1-0,15 kg 5,5 g 0,5 L	156-205	Alm. ukrudtsbestand, vej- og snerlepileurt, spildkartofler, ærenpris-arter, utilstrækkelig effekt på storke- og hejrenæb. INGEN fremspi-rede alm. hanespore. Laveste dosis Tocalis anvendes KUN, hvor der er anvendt DFF / Legacy 500 SC inden majsens fremspiring. Hvor der IKKE er behandlet med DFF / Legacy 500 SC og ærenpris-arter er et dominerende problem, anvendes mindst 0,15 kg/ha Tocalis. Der kan suppleres med 0,05-0,08 l/ha Starane 333 HL ved massiv fremspiring af snerlepileurt. Starane 333 HL må kun anvendes én gang pr. sæson.
2	1.	MaisTer Tocalis Harmony 50 SX MaisOil ³⁾	30 g (- 50 g) 0,08-0,1 kg 5,5 g 0,4 L (-0,67 L)	192-263	Alm. ukrudtsbestand, vej- og snerlepileurt, enårig rapgræs, alm. hanespore. Få storke- og hejrenæb. Laveste dosis Tocalis anvendes KUN, hvor der er anvendt DFF / Legacy 500 SC inden majsens fremspiring. Hvor der IKKE er behandlet med DFF / Legacy 500 SC og ærenpris-arter er et dominerende problem, anvendes mindst 0,15 kg/ha Tocalis. Der kan suppleres med 0,05-0,08 l/ha Starane 333 HL ved massiv fremspiring af snerlepileurt. Starane 333 HL må kun anvendes én gang pr. sæson. Hvor der er fremspi-ret alm. hanespore, f.eks. på foragre, hæves do-sis af MaisTer til mindst 50 g/ha. Giver også effekt på fremspi-ret kvik.
T1 Første bladsprøjtning. Storke- og hejrenæb er dominerende ukrudtsarter					
3	1.	Tocalis Harmony 50 SX Fighter 480 Renol ²⁾	0,06-0,08 kg 5,5 g 0,4-0,75 L 0,5 L	200-293	Tidlig bekæmpelse på første løvblad må ikke forpasses. Storke-/hejre-næb dominerer, ellers almindelig ukrudtsbestand. INGEN fremspi-rede alm. hanespore. Utilstrækkelig effekt på ærenpris. Dosering af Tocalis øges efter behov til 0,12-0,15 kg/ha. Effekt af Fighter 480 er meget afhængig af solskin og gode temperaturer (optimalt 18-22 °C).
T2 Anden bladsprøjtning. Almindelig ukrudtsbestand – max. to løvblade					
4	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	40-60 g 0,15 L 0,53-0,8 L	142-193	Alm. ukrudtsbestand, enårig rapgræs, rajgræsser og mindre kvikbe-stande. Der kan suppleres med 0,05-0,08 kg/ha Tocalis for yderligere effekt mod snerlepileurt. Mod alm. hanespore øges dosis af MaisTer til 90-100 g/ha (løsning 7), eller der vælges i stedet løsning 8.
T1 Første bladsprøjtning. Radrensning OG evt. afsluttende T3 bladsprøjtning					
5	1.	MaisTer Tocalis Harmony 50 SX MaisOil ³⁾	30 g (- 50 g) 0,08-0,1 kg 5,5 g 0,4 L (-0,67 L)	192-263	Alm. ukrudtsbestand, vej- og snerlepileurt, enårig rapgræs. Få storke- og hejrenæb. Laveste dosis Tocalis anvendes KUN, hvor der er anvendt DFF / Legacy 500 SC inden majsens fremspiring. Hvor der IKKE er behandlet med DFF / Legacy 500 SC og ærenpris-arter er et dominerende problem, anvendes mindst 0,15 kg/ha Tocalis. Der kan suppleres med 0,05-0,08 l/ha Starane 333 HL ved massiv fremspiring af snerlepileurt. Denne samlede bekæmpelsesstrategi anbefales IKKE, hvor der er problemer med alm. hanespore og rodukrudt, herunder kvik, da effekten er utilstrækkelig, og opformering må forventes.
	2.	Radrensning		240	Rensning evt. med etablering af græsefterafgrøde, når majsens har 6-8 blade.
	Evt. opfølgende sprøjtning				
	3.	Tocalis Renol ²⁾	0,08 kg 0,5 L	99	Sprøjtes efter behov ved genfremspiring af ukrudt – f.eks. sort natskygge, snerlepileurt eller hvidmelet gåsefod, og genvækst af rodukrudt, som kartofler eller grå bynke (se også løsning 11). Tocalis kan anvendes uden hensyn til græsefterafgrøden.

1) Priserne er beregnet med udgangspunkt i de "Vejledende priser", tabel 1.

2) Renol eller en anden vegetabilsk penetreringsolie.

3) I løsninger med MaisTer + MaisOil undlades Renol.

Tabel 5 Standardløsninger til bekæmpelse af særlige ukrudtsarter med fastlagt bekæmpelsesstrategi i majs

Tocalis / Evolya (500 g-vare)

Løsning		Dosis [l/g/pr. ha]	Pris ¹⁾ [kr. pr. ha]	Ukrudtsbestand og bemærkninger	
Særlige ukrudtsarter – bekæmpelsesstrategi					
T2 Anden bladsprøjtning. Kvik, andre ukrudtsgræsser samt agersvinemælk					
6	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	60-90 g 0,15 L 0,8-1,0 l	193-269	Agersvinemælk og kvik. Alm. ukrudtsbestand, rajgræsser, enårig rapgræs.
7	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	90-100 g 0,15 L 1,0 L	269-295	Alm. hanespore, grøn skærmaks og følfod. Utilstrækkelig effekt mod følfod, men den bedste vi kan opnå. Alm. ukrudtsbestand, kvik, rajgræsser, enårig rapgræs.
T2 Anden bladsprøjtning. Alm. Hanespore og snerlepileurt					
8	2.	Tocalis Onyx MaisTer Starane 333 HL MaisOil	0,1 kg 0,5 L 40-60 g 0,1-0,15 L 0,53-0,8 L	393-457	Alm. Hanespore, snerlepileurt, jordrøg. Tankblandingen giver ekstra effekt mod alm. hanespore og snerlepileurt og kan anvendes, hvor der er massive bestande, eller hvor det almindelige sprøjtetidspunkt er forpasset.
T1 og T2 Første og anden bladsprøjtning. Agermynte og kærgaltetand					
9	1.	MaisTer Tocalis Harmony 50 SX MaisOil ³⁾	30 g 0,08-0,1 kg 5,5 g 0,4 L	385-456	Agermynte, kærgaltetand. Alm. ukrudtsbestand, rajgræsser, enårig rapgræs. Hvor ærenpris-arter er et dominerende problem, hæves doseringen af Tocalis til mindst 0,15 kg/ha i første sprøjtning.
	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	60-80 g 0,15 L 0,8 L		
T1 og T2 Første og anden bladsprøjtning. Agertidsel					
10	1.	Tocalis Harmony 50 SX Renol ²⁾	0,12 kg 5,5 g 0,5 L	412-458	Agertidsel. Alm. ukrudtsbestand, enårig rapgræs. Hvor alm. hanespore er fremspiret ved første sprøjtning, øges dosis af MaisTer til 50 g/ha, og dosis af MaisTer øges til 90-100 g/ha i anden sprøjtning.
	2.	Tocalis MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	0,12-0,15 kg 40 g 0,06-0,12 L 0,53 L		
T1, T2 og T3 Første, andet og tredje bladsprøjtning. Spildkartofler og grå bynke					
11	1.	Tocalis Harmony 50 SX Renol ²⁾	0,12 kg 5,5 g 0,5 L	472-488	Spildkartofler og grå bynke. Alm. ukrudtsbestand, enårig rapgræs. Hvor alm. hanespore er fremspiret ved første sprøjtning, øges dosis af MaisTer til 50 g/ha, og dosis af MaisTer øges til 90-100 g/ha i anden sprøjtning. Løsningen er også aktuel, hvor der er tæt bestand og fortsat fremspiring af sort natskygge.
	2.	Tocalis MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	0,08 kg 40 g 0,06-0,12 L 0,53 L		
	3.	Tocalis Renol ²⁾	0,08 kg 0,5 L		

1) Priserne er beregnet med udgangspunkt i de "Vejledende priser" fra Middeldatabasen, tabel 1.

2) Renol eller en anden vegetabilsk penetreringsolie.

3) I løsninger med MaisTer + MaisOil undlades Renol.