

Tabel 1. Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn.

Sygdomme	Amistar Gold/Greteg Star (Azoxystrobin + difenoconazol)	Amistar/Mirador (Azoxystrobin)	Balaya (Mefentrifluconazol + pyraclostrobin)	Comet Pro (Pyraclostrobin)	Entargo (Boscalid)	Folicur Xpert EC 240 (Tebuconazol + prothioconazol)	Juventus 90 (Metconazol)
Knækkefodsyge	-	-	+	-	++	+	-
Hvedemeldug	+(*) ¹⁾	+1)	+++	+1)	-	+++(*)	++
Bygmeldug	-	+1)	+++	++1)	-	+++(*)	+++
Gulrust	+++	+++	++++	+++(*)	+	++++	++(*)
Brunrust	+++	+++(*)	++++(*)	++++	+	++++	+++(*)
Bygrust	-	++++(*)	++++(*)	++++(*)	+	++++(*)	++++
Septoria	++(*)	+1)	++++(*)	+1)	++	++(*)	++(*)
Hvedebladplet	+1)	+1)	++	+1)	-	++	+
Skoldplet	++	++(*)	+++(*)	+++(*)	+	+++	+++
Bygbladplet	-	++(*) ²⁾	+++(*)	++++	++	++(*)	++(*)
Ramularia	-	-	+++(*)	-	++	+	-
Aksfusarium	-	-	+	-	-	++(*)	++
Normaldosering, liter/kg pr. ha ⁴⁾	1,0	1,0	1,5	1,25	0,7	0,5 ³⁾	1,0
Pris pr. normaldosering inkl. afgift, ekskl. moms	305	235	699	413	310	138	282

Sygdomme	Orius Gold (Tebuconazol)	Pictor Active (Pyraclostrobin + boscalid)	Proline (Prothioconazol)	Proline Xpert EC 240 (Tebuconazol + prothioconazol)	Propulse (Prothioconazol + fluopyram)	Prosaro (Tebuconazol + prothioconazol)	Talius (Proquiazid)
Knækkefodsyge	-	+(*)	++	++	+(*)	+(*)	-
Hvedemeldug	+++(*)	+1)	+++(*)	+++(*)	+++(*)	+++(*)	++++
Bygmeldug	++++	++1)	+++(*)	+++(*)	+++(*)	+++(*)	++++
Gulrust	++++(*)	+++	+++	+++(*)	+++	++++	-
Brunrust	++++(*)	++++	+++	+++(*)	+++	++++	-
Bygrust	+++++	+++(*)	+++(*)	++++	+++(*)	++++(*)	-
Septoria	++(*)	++	++(*)	++(*)	+++(*)	++(*)	-
Hvedebladplet	+	-	+++(*)	+++(*)	+++(*)	+++	-
Skoldplet	++	++++	++++	++++	++++(*)	+++	-
Bygbladplet	++(*)	++++	+++	+++	++++(*)	++(*)	-
Ramularia	-	+	++	+	+++	+	-
Aksfusarium	++	-	++(*)	++(*)	++(*)	++(*)	-
Normaldosering, liter/kg pr. ha ⁴⁾	1,25	1,0	0,8	0,75 ³⁾	1,0	1,0	0,25
Pris pr. normaldosering inkl. afgift, ekskl. moms	215	392	352	281	360	320	174

- = ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data
+ = svag effekt (under 40 %)
++ = nogen effekt (40-50 %)
+++ = middel til god effekt (51-70 %)
++++ = meget god effekt (71-90%)
+++++ = specialmiddel (91-100 %) (*) = en halvstjerne
1) På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug meget begrænset.
2) Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador. En resistens, som for tiden kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
3) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
4) Vær obs på, at for midler omfattet af de nye triazolregler er de tilladte doser lavere end de angivne normaldoseringer. Dosis for Amistar/Mirador er også afhængig af vækststadiet.