

Tabel 8 Standardløsninger til bekæmpelse af **almindelig ukrudtsbestand**, samt **hejre- og storkenæb** i majs på ukrudt med **max. to løvblade**. **Callisto, Lumica, Starship Max og andre 100 g-varer.**

Løsning		Dosis [L/g/pr. ha]	Pris ¹⁾ [kr. pr. ha]	Ukrudtsbestand og bemærkninger	
Almindelig ukrudtsbestand					
T1 Første bladsprøjtning. Almindelig ukrudtsbestand – max. to løvblade					
1	1.	Callisto Harmony 50 SX Renol ²⁾	0,5-0,75 L 5,5 g 0,5 L	171-224	Alm. ukrudtsbestand, vej- og snerlepileurt, spildkartofler, ærenpris-arter, utilstrækkelig effekt på storke- og hejrenæb. INGEN fremspirede alm. hanespore. Hvor alm. hanespore er fremspiret henvises til løsning 2 og 9. Laveste dosis Callisto anvendes KUN, hvor der er anvendt DFF / Legacy 500 SC inden majsens fremspiring. Hvor der IKKE er behandlet med DFF / Legacy 500 SC og ærenpris-arter er et dominerende problem, anvendes mindst 0,75 L/ha Callisto. Der kan suppleres med 0,05-0,08 L/ha Starane 333 HL ved massiv fremspiring af snerlepileurt. Starane 333 HL må kun anvendes én gang pr. sæson.
2	1.	MaisTer Callisto Harmony 50 SX MaisOil ³⁾	35 g (- 50 g) 0,4-0,5 L 5,5 g 0,5 L (-0,67 L)	221-283	Alm. ukrudtsbestand, vej- og snerlepileurt, enårig rapgræs, alm. hanespore. Få storke- og hejrenæb. Laveste dosis Callisto anvendes KUN, hvor der er anvendt DFF / Legacy 500 SC inden majsens fremspiring. Hvor der IKKE er behandlet med DFF / Legacy 500 SC og ærenpris-arter er et dominerende problem, anvendes mindst 0,75 l/ha Callisto. Der kan suppleres med 0,05-0,08 l/ha Starane 333 HL ved massiv fremspiring af snerlepileurt. Starane 333 HL må kun anvendes én gang pr. sæson. Hvor der er fremspiret alm. hanespore, f.eks. på foragre, hæves dosis af MaisTer til mindst 50 g/ha, eller der suppleres med 0,4-0,5 L/ha Onyx. Se også løsning 9.
T1 Første bladsprøjtning. Storke- og hejrenæb er dominerende ukrudtsarter					
3	1.	Callisto Harmony 50 SX Fighter 480 Renol ²⁾	0,4 L 5,5 g 0,4-0,75 L 0,5 L	234-308	Tidlig bekæmpelse på første løvblad må ikke forpasses. Storke-/hejrenæb dominerer, ellers almindelig ukrudtsbestand. INGEN fremspirede alm. hanespore. Utilstrækkelig effekt på ærenpris. Dosering af Callisto øges efter behov til 0,6-0,75 L/ha. Effekt af Fighter 480 er meget afhængig af solskin og gode temperaturer (optimalt 18-22 °C).
T2 Anden bladsprøjtning. Almindelig ukrudtsbestand – max. to løvblade					
4	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	40-60 g 0,15 L 0,53-0,8 l	153-208	Alm. ukrudtsbestand, enårig rapgræs, rajgræsser og mindre kvikbestande. Der kan suppleres med 0,25-0,4 L/ha Callisto for yderligere effekt mod snerlepileurt. Mod alm. hanespore øges dosis af MaisTer til 90-100 g/ha (løsning 7), eller der vælges i stedet løsning 8.
T1 Første bladsprøjtning. Radrensning OG evt. afsluttende T3 bladsprøjtning					
5	1.	MaisTer Callisto Harmony 50 SX MaisOil ³⁾	40 g (- 50 g) 0,4-0,5 L 5,5 g 0,4 L (-0,67 L)	235-283	Alm. ukrudtsbestand, vej- og snerlepileurt, enårig rapgræs. Få storke- og hejrenæb. Laveste dosis Callisto anvendes KUN, hvor der er anvendt DFF / Legacy 500 SC inden majsens fremspiring. Hvor der IKKE er behandlet med DFF / Legacy 500 SC og ærenpris-arter er et dominerende problem, anvendes mindst 0,75 L/ha Callisto. Der kan suppleres med 0,05-0,08 L/ha Starane 333 HL ved massiv fremspiring af snerlepileurt. Denne samlede bekæmpelsesstrategi anbefales IKKE, hvor der er problemer med alm. hanespore og rod ukrudt, herunder kvik, da effekten er utilstrækkelig, og opformering må forventes.
	2.	Radrensning		275	Rensning evt. med etablering af græsefterafgrøde (tillæg + 50 kr./ha), når majs har 6-8 blade.
	Evt. opfølgende sprøjtning				
	3.	Callisto Renol ²⁾	0,5 L 0,5 L	132	Sprøjtes efter behov ved genfremspiring af ukrudt – f.eks. sort nat-skygge, snerlepileurt eller hvidmelet gåsefod, og genvækst af rod ukrudt, som kartofler eller grå bynke (se også løsning 10). Callisto kan anvendes uden hensyn til græsefterafgrøden.

1) Priserne er beregnet med udgangspunkt i de "Vejledende priser", tabel 3.

2) Renol eller en anden vegetabilsk penetreringsolie.

3) I løsninger med MaisTer + MaisOil undlades Renol.

Tabel 9 Standardløsninger til bekæmpelse af særlige ukrudtsarter med fastlagt bekæmpelsesstrategi i majs. **Callisto, Lumica, Starship Max og andre 100 g-varer.**

Løsning		Dosis [L/g/pr. ha]	Pris ¹⁾ [kr. pr. ha]	Ukrudtsbestand og bemærkninger	
Særlige ukrudtsarter – bekæmpelsesstrategi					
T2 Anden bladsprøjtning. Kvik, andre ukrudtsgræsser samt agersvinemælk					
6	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	60-90 g 0,15 L 0,8-1,0 L	208-292	Agersvinemælk og kvik. Alm. ukrudtsbestand, rajgræsser, enårig rapgræs.
7	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	90-100 g 0,15 L 1,0 L	292-319	Alm. hanespore, grøn skærmaks og følfod. Utilstrækkelig effekt mod følfod, men den bedste vi kan opnå. Alm. ukrudtsbestand, kvik, rajgræsser, enårig rapgræs.
T2 Anden bladsprøjtning. Alm. Hanespore og snerlepileurt					
8	2.	Callisto Onyx MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	0,5 L 0,5 L 40-60 g 0,1-0,15 L 0,53-0,8 L	409-478	Alm. Hanespore, snerlepileurt, jordrøg. Tankblandingen giver ekstra effekt mod alm. hanespore og snerlepileurt og kan anvendes, hvor der er massive bestande, eller hvor det almindelige sprøjtetidspunkt er forpasset.
T1, T2 og T3 Første, anden og tredje bladsprøjtning. Alm. hanespore, almindelig ukrudtsbestand samt rodukrudt					
9	1.	Onyx Callisto Harmony 50 SX Renol ²⁾	0,4-0,5 L 0,6 L 5,5 g 0,5 L	748-781	Hvor Alm. Hanespore er fremspiret - almindelig ukrudtsbestand. Anvend ikke mindre end 0,4 L Onyx ved T1, og ikke mindre end 90 g MaisTer ved T2. Løsningen har også god effekt på flere rodukrudsarter, og sent fremspirende arter som sort natskygge. Hvis tidspunkt for T2 er forpasset, dvs. alm. hanespore har mere end to blade, anbefales løsning 8 i stedet.
	2.	MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	90 g 0,15 L 1,0 L		
	3.	Callisto Renol ²⁾	0,5 L 0,5 L		
T1, T2 og T3 Første, andet og tredje bladsprøjtning. Spildkartofler, grå bynke og agertidse					
10	1.	Callisto Harmony 50 SX Renol ²⁾	0,5 L 5,5 g 0,5 L	536-553	Spildkartofler, grå bynke og agertidse. Alm. ukrudtsbestand, enårig rapgræs. Hvor alm. hanespore er fremspiret ved T1 suppleres med 0,4-0,5 L Onyx. Findes der alm. hanespore ved T2, øges dosis af MaisTer til 90-100 g/ha. Løsningen er også aktuel, hvor der er tæt bestand og fortsat fremspiring af sort natskygge. Bemærk, at der med ATR Mesotrion 100 SC og Starship Max kun må behandles to gange pr. år.
	2.	Callisto MaisTer Starane 333 HL MaisOil ³⁾	0,5 L 40 g 0,06-0,12 L 0,53 L		
	3.	Callisto Renol ²⁾	0,5 L 0,5 L		

1) Priserne er beregnet med udgangspunkt i de "Vejledende priser", tabel 3.

2) Renol eller en anden vegetabilsk penetreringsolie.

3) I løsninger med MaisTer + MaisOil undlades Renol.