

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS (19-109), Kalif 360 CS (396-57) og Clomate (756-1) mod ukrudt i bederoer til foder og fødevarer

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlantInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midletseffektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Command CS (19-109), Kalif 360 CS (396-57) og Clomate (756-1) i bederoer til foder og fødevarer

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i bederoer.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.m.), for at skåne organismer der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter
- Må ikke anvendes senere end 3 dage før fremspring
- Midlerne eller andre midler der indeholder clomazon, må maksimalt anvendes hvert 3. år på arealet

Advarsel

”Se [Command CS](#), [Kalif 360 CS](#) eller [Clomate](#) etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Command CS, Kalif 360 CS og Clomate i bederoer til foder og fødevarer

Bekæmpelse

Midlerne anvendes før fremspring af roerne som første led i et sprøjteprogram med flere sprøjtninger. Midlerne anvendes med henblik på at opnå tilstrækkelig effekt mod hundepersille og en supplerende effekt mod burresterre. Midlerne har også effekt mod fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

Dosering

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger*	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)
Bederoer til foder og fødevarer	Ukrudt	0,20 L/ha	1 gang hvert 3. år	Ikke senere end 3 dage før fremspiring

* Midlerne eller andre midler der indeholder clomazon, må maksimalt anvendes hvert 3. år på arealet.

Risiko for skade

For at mindske risikoen for skade skal roefrøene være sået i ensartet dybde.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at midlerne kan medføre skader på afgrøden. På lettere jorder virker clomazon-holdige midler kraftigere på såvel ukrudt som afgrøde. Derfor anbefales det at reducerer doseringerne til ½ mængde af udgangsdoseringen.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 16. oktober 2019