

Tabel 2 Løsninger til **tidligt sået hvede, rug og triticale**. Vi anbefaler ikke tidlig såning (før 15.sept.) af vinterbyg. Ukrudt med 0-2 blade. NB begrænsninger for brug af flere midler i rug ses under "bemærkninger".

Løsning	Ukrudtsarter. Fed skrift: Sikker effekt	St. 8-9 (3-5 dage efter såning)	St 10-11 (10-12 dage efter såning)	St 12-13 (når nyt ukrudt er fremme)	Kemi-pris, kr./ha	Bemærkninger
1	Fuglegræs, hyrdetaske, agerstedmoder, tvetand, ærenpris, burresnerre m.fl. samt enårig rapgræs, vindaks	I: 0,075-0,1 l/ha DFF/Legacy 500		II: 0,75 Boxer	165-180	I: Begge midler max 1 gang pr sæson. II: Husk afdrift-reduktion
2	Arter fra løsning 1 samt kamille, raps, storkenæb, kornblomst, alm. brandbæger.	I: 0,35*-0,5 l/ha Mateno Duo 600 SC		II: 0,75 Boxer	290-355	Begge midler max 1 gang pr sæson I: I rug afventes kornets grønne farve før behandling med Mateno Duo. Max dosis i rug 0,35 l/ha II: Husk afdrift-reduktion
3.	Arter fra løsning 2 samt: rajgræs væselhale	I: 0,35*-0,7 l/ha Mateno Duo 600 SC	II: 1,5 -2,0 l/ha Boxer	III: 0,2 l/ha Topik EC + 0,5 olie	580-820	Alle midler må max bruges 1 gang pr sæson I: I rug afventes kornets grønne farve før behandling med Mateno Duo og max dosis er 0,35 l/ha II: Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke er "Boxervejr", udsættes behandling til st. 12, og der iblandes Topik og olie. III: Aktuelt ved store mængder rajgræs (eller agerrævehale). Der behandles på småt græs, med max 1 blad. OBS sprøjteteknik. Der kan opfølges med Cossack OD eller lignende til foråret, mod (ikke-resistente) rajgræs m.m. I <i>hvede</i> foretrækkes ca. 1 l Adimax + 0,5 olie i stedet for Topik (Adimax virker også på resistent rajgræs)

4.	Arter fra løsning 2 samt: rajgræs (SU/ALS-resistente), væselhale, ager- rævehale	I: 0,35*-0,7 l/ha Mateno Duo 600 SC	II: 1,5 -2,0 l/ha Boxer	III: 0,45*- 0,7 l/ha Atlantis OD	570-900	Alle midler må max bruges 1 gang pr sæson I: I rug afventes kornets grønne farve før behandling med Mateno Duo og max dosis er 0,35 l/ha II: Husk afdrift-reduktion. Hvis det ikke er "Boxervejr", udsættes behandling til st. 12, og blandes med Topik og olie. Min. 2,0 l/ha Boxer mod agerrævehale III: Aktuelt ved store mængder SU/ALS-resistent rajgræs. Max 0,45 l/ha Atlantis OD i rug. Forudsætter at Atlantis, der netop ER et SU-middel, bruges på <i>helt små</i> græsser som <i>bladmiddel</i> - OBS sprøjteteknik. NB opfølgning med Cossack og andre SU- midler til foråret ikke tilladt
----	--	---	----------------------------	--	---------	---

*Max dosis i rug