

Tabel 4 Havre. Standard-sprøjteforslag til ukrudtsbekæmpelse i **havre** fra vækststadium 20 og ukrudt med 3-4 løvblade.

Ager- og Haver-Standard Sprøjterbrug til ukrudtsbekæmpelse i haver fra vækststadium 20 og ukrudt med 3-4-årsblad.

	Ukrudtsbestand	Middel	Dosis [L/g pr. ha]	Vejl. Pris [kr. pr. ha]	Bemærkninger
1	Agerstedmoder, burre-snerre, fuglegræs, hane-kro, hejrenæb, kamille, pileurt – bleg, fersken, snerle og vej-, ærenpris	Express 50 SX Starane 333 HL ¹⁾	5 0,15	61	2), Anvend eventuelt 7,5 g/ha Express Gold 33 SX i stedet for Express 50 SX – dog IKKE i korn med græsudlæg. Temp.: Min. 10 °C, optimalt > 12 °C
2	Store burresnerre, fugle-græs, tæt bestand af fer-sken-, bleg- og snerlepile-urt samt hane-kro	Express 50 SX Starane XL ⁴⁾	5 0,4	88	2), Temp.: Min. 5 °C, optimalt 15 °C
3	Lavbundsjord samt som løsning 2. OBS: Splitsprøjtning med 10 til 14 dage imellem	1. behandling Express 50 SX Starane 333 HL ¹⁾	6 0,15	138	Express 50 SX kan erstattes af 10 g Nicanor SG eller 8 g Express Gold 33 SX – dog IKKE i korn med græsudlæg.
		2. behandling Starane XL ⁴⁾	0,4		
Løsninger med Mustang Forte – læs forbehold for efterfølgende afgrøde m.v.!!					
4	Resistent fuglegræs / ka-mille, gul okseøje Store burresnerre, fer-sken-, bleg- og snerlepile-urt, kornblomst, svine-mælk og kruset skræppe	Mustang Forte ⁵⁾ Express 50 SX	0,45 5	100	Ikke i forfrugt til kartofler, roer, bælgplanter og lign.

Løsningsforslagene nr. 1 og 3 – første behandling, tilsættes altid 0,15-0,2 L/ha sprede-klæbemiddel; pris for 0,15 L/ha er ind-regnet.