

Bekæmpelse af rodukruddt i vårhvede

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	BI	Pris	Bemærkninger
Aftenpragstjerne	Afgrødens stadium 30-32	Zypar + Metaxon + Nuance Max 75 WG	(0,75 + 0,5 + 7,5) - (1 + 0,5 + 7,5)	2,13-2,50	327-385	Når skud af aftenpragstjerne er 10-15 cm. Seneste i afgrødens stadium 39.
Agermynte	Afgrødens stadium 30-32	Express Gold 33 SX	18	1,03	68	Når skud af agermynte er 10-15 cm. Senest i afgrødens stadium i stadium 39.
Agermynte	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,75	1,09	143	Når skud af agermynte er 10-15 cm. Senest i afgrødens stadium 32.
Agermynte	Afgrødens stadium 30-32	Starane XL	1	1,29	184	Når skud af agermynte er 10-15 cm. Senest i afgrødens stadium 45.
Agermynte	Afgrødens stadium 30-32	Metaxon	1	0,50	245	Når skud af agermynte er 10-15 cm. Senest i afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Agermynte	Indtil 10 dage før høst	Roundup XXL + Spredede-klæbemiddel + Ammoniumsulfat-opløsning	3 + 0,15 + 2	0,86	244	Før høst. Kun pletsprøjtning i foderafgrøder. Andre glyphosat-produkter kan anvendes. Maks. 1 behandling pr. høstår.
Agerpadderok	Afgrødens stadium 32-39	Metaxon + Ammoniumsulfat-opløsning + Spredede-klæbemiddel	1 + 2 + 0,15	0,50	264	I maj/juni når agerpadderok er 15-25 cm og endnu har friske lysegrønne blade. Senest i afgrødens stadium 39. Gentagelse af behandling i 2-3 vækstsæsoner har større betydning end den anvendte dosis. Andre MCPA-midler kan anvendes. Tilsætning af ammoniumsulfat øger effekten mod agerpadderok.
Agerpadderok	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,5 - 0,75	0,72-1,09	96-143	Senest i afgrødens stadium 32. Vigtigt at agerpadderok er fremspiret ved behandling for effekt. Gentagelse af behandling i 2-3 vækstsæsoner har større betydning end den anvendte dosis.
Agersnerle	Afgrødens stadium 30-32	Starane XL	1	1,29	184	Starane XL kan erstattes med Cleave. Senest i afgrødens stadium 45.
Agersnerle	Afgrødens stadium 30-32	Metaxon	1	0,50	245	Når agersnerle er 10-15 cm. Senest afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Agertidse	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,75	1,09	143	Når tidse er 15-25 cm. Senest i afgrødens stadium 32.

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	BI	Pris	Bemærkninger
Agertidse	Afgrødens stadium 32-39	Metaxon + Zypar	0,75 + 0,5	1,13	301	Når tidselskud er 15-25 cm. Der bør være omkring 14 dages afstand mellem ukrudtssprøjtning med 'minimiddel' og MCPA, så tidslerne er i god vækst. Senest i afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes. Løsningen er primært et alternativ til Mustang Forte på arealer, hvor afgrøde- og halmrestriktioner ikke ønskes.
Agertidse	Afgrødens stadium 32-39	Metaxon + Ammoniumsulfat-opløsning + Sprede-klæbemiddel	1 + 2 + 0,2	0,50	265	Når tidselskud er 15-25 cm. Her er ca. 25 procent af skud i tidligt knopstadium, hvor tidsel har tørstofminimum og transport til rødder er størst. Der bør være omkring 14 dages afstand mellem ukrudtssprøjtning med 'minimiddel' og MCPA, så tidslerne er i god vækst. Senest i afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes. Tilsætning af ammoniumsulfat forbedrer sandsynligvis effekten ved lav luftfugtighed.
Agersvinemælk	Afgrødens stadium 30-32	Metaxon	1	0,50	245	Når agersvinemælk er 10-20 cm. Senest i afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes. Kombineres i korn til foder evt. med 1080 g glyphosat pr. hektar senest 10 dage før høst. Glyphosat har god effekt og bedre langtidsvirkning end MCPA.
Agersvinemælk	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,75	1,09	143	Når agersvinemælk er 10-20 cm. Senest i afgrødens stadium 32.
Agersvinemælk	Indtil 10 dage før høst	Roundup XXL + Sprede-klæbemiddel + Ammoniumsulfat-opløsning	3 + 0,15 + 2	0,86	244	Kun pletsprøjtning i foderafgrøder. Andet glyphosat-middel kan anvendes med 1080 g pr. ha. Svinemælk er en af de arter af rod ukrudt, hvor glyphosat har god effekt. Der er bedre langtidsvirkning end af MCPA. Maks. 1 behandling pr. høstår.
Følfod	Afgrødens stadium 30-32	Express 50 SX + Metaxon	15 + 1	1,50	288	Express og MCPA har hver for sig vist utilstrækkelig langtidseffekt i forsøg. Forsøg har derimod vist, at følfod bekæmpes effektivt med glyphosat i stub. Blandingen kan undertrykke følfod i vækstsæsonen. Blandingen må senest anvendes i afgrødens stadium 39.
Følfod	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,75	1,09	143	Det må forventes at behandling skal følges op med glyphosat mod genvækst i stub. Senest i afgrødens stadium 32.

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	BI	Pris	Bemærkninger
Gederams	Afgrødens stadium 30-32	Metaxon	1	0,50	245	Når gederams er 10-20 cm. Senest i afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Gråbynke	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,75	1,09	143	Når gråbynke er 10-15 cm. Senest i kornets stadium 32. Ved store bestande bør vælges en løsning med to behandlinger i kombination med andre produkter.
Gråbynke	Afgrødens stadium 30-32	Zypar	1	1,50	235	Når gråbynke er 10-15 cm. Senest i kornets stadium 45. Ved store bestande bør vælges en løsning med to behandlinger i kombination med andre produkter.
Gråbynke	Afgrødens stadium 30-32	Metaxon	1	0,50	245	Når gråbynke er 10-15 cm. Senest i afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes. Svingende effekt kan forventes. Det er usikkert om tilsætning af 2 l/ha ammoniumsulfat + 0,2 l/ha spredmiddel øger effekten.
Gråbynke	Afgrødens stadium 30-32	Metaxon + Express 50 SX	(1 + 10) - (1 + 15)	1,17-1,50	274-288	Når gråbynke er 10-15 cm. Senest i afgrødens stadium 39. Svingende effekt kan forventes. Ved store bestande bør vælges en løsning med to behandlinger i kombination med andre produkter. Der må forud ikke være anvendt midler med tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Andre MCPA- og tribenuronmidler kan anvendes.
Gråbynke	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,75	2,96	340	En todelt løsning ved mange gråbynke. Første behandling når gråbynke er 10-15 cm. Anden behandling ca. 14 dage senere. Mustang Forte anvendes senest i afgrødens stadium 32.
	Afgrødens stadium 32-39	Pixxaro EC + Nuance Max 75 WG	0,35 + 7,5			
Gråbynke	Afgrødens stadium 30-32	Zypar + U46 M	0,5 + 0,75	2,68	450	En todelt løsning ved mange gråbynke. Første behandling når gråbynke er 10-15 cm. Anden behandling ca. 14 dage senere. Løsningen har ikke restriktioner til halmanvendelse eller efterfølgende afgrøde.
	Afgrødens stadium 32-39	Pixxaro EC + Nuance Max 75 WG	0,25 + 7,5			
Spildkartofler	Afgrødens stadium 30-32	Mustang forte	0,75	1,09	143	Senest i afgrødens stadium 32. Behandling med 0,35 l/ha Pixxaro eller 0,3 l/ha Starane 333 HL ca. 14 dage senere vil øge effekten. Spildkartoflerne vil trods behandlingen sætte en del døtreknolde.

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	BI	Pris	Bemærkninger
Spildkartofler	Afgrødens stadium 30-39	Pixxaro EC	0,35	1,13	169	Senest i afgrødens stadium 45. Pixxaro har ingen restriktioner mht. efterfølgende afgrøde. Spildkartoflerne vil trods behandlingen sætte en del døtreknolde.
Spildkartofler	Afgrødens stadium 30-39	Starane 333 HL	0,3	0,79	95	Senest i afgrødens stadium 45. Starane 333 HL eller tilsvarende fluroxypyr-middel kan dæmpe vækst af kartofler, men de kan ikke effektivt bekæmpes i vækstsæsonen. Spildkartoflerne vil trods behandlingen sætte en del døtreknolde.
Spildkartofler	Afgrødens stadium 32-39	Zypar	1	1,50	235	Senest i afgrødens stadium 45. Zypar har ingen restriktioner mht. efterfølgende afgrøde. 1 l/ha Zypar pr. ha har lidt lavere effekt mod spildkartofler end 0,35 l/ha Pixxaro med 0,35 l. Spildkartoflerne vil trods behandlingen sætte en del døtreknolde.
Spildkartofler	Indtil 10 dage før høst	Roundup XXL + Sprede-klæbemiddel + Ammoniumsulfat-opløsning	(2 + 0,15 + 2) - (2,5 + 0,15 + 2)	0,57-0,71	169-206	Kun pletsprøjtning i foderafgrøder. Andre glyphosat-produkter kan anvendes (720-900 g/ha). Glyphosat udbragt før høst på grøn kartoffeltop ødelægger døtreknolde, så de ikke spirer frem næste sæson. Maks. 1 behandling pr. høstår.
Kærgaltetand	Afgrødens stadium 30-32	Zypar	1	1,50	235	Når kærgaltetand er 10-20 cm. Senest i afgrødens stadium 45.
Kærgaltetand	Afgrødens stadium 30-32	Metaxon	1	0,50	245	Når kærgaltetand er 10-20 cm. Senest i afgrødens stadium 39. Andre MCPA-midler kan anvendes.
Kruset skræppe	Afgrødens stadium 30-39	Starane 333 HL	0,3	0,79	95	Sprøjt når skræppe er 15-20 cm høje. Senest i afgrødens stadium 45.
Kruset skræppe	Afgrødens stadium 30-39	Starane XL	1	1,29	184	Sprøjt når skræppe er 15-20 cm høje. Senest i afgrødens stadium 45. Starane XL kan erstattes med Cleave.
Kruset skræppe	Afgrødens stadium 30-39	Express 50 SX + Sprede-klæbemiddel	15 + 0,15	1,00	47	Når skræpper er 15-20 cm høje. Senest i afgrødens stadium 39. Andre tribenuron-midler kan anvendes.
Vandpileurt	Afgrødens stadium 30-32	Starane 333 HL	0,3	0,79	95	Sprøjt når vandpileurt er 10-20 cm, gode temperaturforhold. Senest i afgrødens stadium 45.
16-05-2025		Dansk Landbrugsrådgivning SEGES Innovation			Data leveret af Middeldatabasen	