



KvægInfo – December 2021

Indhold

- Tak for i år!
- Kontakt mellem jul og nytår
- Ensilageprøverne 2021
- Grovfoderstrategi
- OBS på melldrøjer
- Melldrøjer i rug
- Staldskoler i SAGRO Kvæg
- Så er staldskolerne skudt i gang
- Kontakt
- Kvægrådgivere hos SAGRO

TAK FOR I ÅR!

Kontakt mellem jul og nytår

Vi i SAGRO Kvæg ønsker dig en god jul og et godt nytår! Vi ser frem til et spændende samarbejde i 2022.

Mellem jul og nytår er der mulighed for at ringe til Kvægafdelingen, hvor Ejvin Kortegaard vil passe telefonen de fleste dage og Bruno Due vil være til rådighed den 27.12.



ENSILAGEPRØVERNE 2021

Grovfoderstrategi

Af Kvægrådgiver Bjørg Noël Andersen

Første slæt kan være lumsk!

I 2021 var vejret ikke helt med os og 1. slæt gik hos nogen i stængel. Det gav udslag på mere NDF og lavere fordøjelighed af NDF og organisk stof, og altså mindre energirig og hos nogen nærmest kasseret til kviegræs.

Hvor henter vi proteinet?

Med de stigende proteinpriser er der kommet øget fokus på selvforsyningsgraden. Der tænkes i alternative proteinkilder, så som lupiner, hestebønner, ærter etc. Men tænk engang, græs er også proteinrigt og dette kan optimeres yderligere. Gældende på tværs af alle slæt i 2021 var et højere proteinindhold. Især 3., 4. og 5. slæt har bidraget med meget hjemmeavlet protein i år.

Hvordan omsætter vi informationen til en super grovfoderstrategi?

Kombinerer vi kendskabet til proteinindhold, NDF, fordøjelighed af organisk stof – og FK-NDF, samt energiindholdet i græsensilage, så kan vi komme med et bud på, hvilke slæt der bør gå til hvilke dyr. For 2021 kunne 1., 2., og 4. slæt passende gå til køerne. Disse 3 slæt kan også fint indgå i en lagkagedeling. Her fås energi og høj fordøjelighed fra 1. slæt, samt protein fra 2. og 4. slæt. På bedrifter med 5-slæt strategi og store lagre kunne 2., 4., og 5., slæt gå til køerne. Der hentes både protein og energi i 5. slæt. Kvierne skal også forsynes med protein og her kan det være fint at bruge 3. og 5. slæt, men gør op med jer selv om proteinet i 5. slæt skal ofres på kvierne – i mange tilfælde kan det næsten blive for krads for dem. Hertil kan strategien til kvierne være en kombination af 3. slæt, helsæd og majs.

Majs og stivelsesfoder

NorFor har opdateret samtlige fodermidler per 27. oktober 2021. Derfor er energiindholdet i især majs og andre høvjærddiagrøder steget markant. Med de høje priser på stivelse kan det være en fin strategi at lade nogle hektar majs stå til kolbe-, eller kernemajs. I det nederste billede ses det, at kernemajs bidrager med mere stivelse og energi end byg.

Analyseresultater opdateret d. 06-12-21							Indl. frisk græs analyser m.m.
NorFor	Græsensilage						
	1.slæt	2.slæt	3.slæt	4.slæt	5.slæt	6.slæt	Gns. 2021
Antal analyser	362	230	204	204	6	4	1322
Ig tørstof	333	361	380	293	221	322	344
Ig råaske	83	91	98	110	110	141	93
Ig råprotein	147	172	169	191	201	191	167
Ig opløseligt råprotein	668	588	546	565	573	567	568
Ig sukker	49	47	39	25	14	25	42
IFK org. stof	76,9	76,6	74,4	76,5	77,8	77,0	76,3
IFK NDF	70,9	68,7	64,5	67,1	68,4	70,8	68,1
Ig NDF	446	418	420	389	373	387	420
Ig iNDF	134	141	168	161	170	144	153
AAT v. 20 kg TS	75	76	75	74	72	72	76
PBV v. 20 kg TS	25	45	46	66	72	65	42
NEL v. 20 kg TS	6,30	6,27	6,03	6,23	6,29	6,09	6,23
IKg ts pr. FEN	1,18	1,19	1,23	1,19	1,18	1,22	1,19
IKg foder pr. FEN	3,55	3,28	3,24	4,07	5,34	3,79	3,47

NorFor	Helsæd (majs)			Crimpet	
	Frisk anl.	Majs	Kolbe	Byg	Kernemajs
Antal analyser	68	453	63	15	4
Ig tørstof	292	347	514	828	619
Ig råaske	33	30	21	21	22
Ig råprotein	76	72	75	101	84
Ig opløseligt råprotein	296	523	436	0	319
Ig sukker	89	11	11	0	10
Ig stivelse	221	307	505	538	674
IFK org. stof	77	78	84	86	89
IFK NDF	68	66	70	55	56
Ig NDF	444	377	250	161	110
Ig iNDF	192	199	153	163	91
AAT v. 20 kg TS	95,9	86,2	97,0	99,5	108,0
PBV v. 20 kg TS	-75,5	-63,2	-78,6	-45,9	-74,0
NEL v. 20 kg TS	6,30	6,66	7,43	7,31	7,89
IKg ts pr. FEN	1,18	1,12	1,00	1,02	0,94
IKg foder pr. FEN	4,03	3,21	1,95	1,23	1,52

OBS PÅ MELDRØJER

Meldrøjer i rug

Af Kvægrådgiver Ann Katrine Nielsen

Meldrøjer kan opstå som problemer i rug. Meldrøjer egner sig ikke i foder til køer, pga. af det giver risiko for forgiftning. Én tommelfingerregel, for hvor grænsen går ved for hvor mange meldrøjer man kan finde, er 16 meldrøjer/kg rug.

Selvom rug ludbehandles, fjerner det ikke giftigheden i meldrøjerne.

Symptomerne på meldrøjer i rug, i for stor mængde er bl.a.:

- Dårlig trivsel
- Nedsat mælkeproduktion
- Koldbrand – pga. hæmmet blodcirkulation
- Feber

Derfor vær opmærksom når du fodrer med rug, uanset om det er valset, ludbehandlet eller har været gennem andre behandlingsformer. Det er vigtigt og specielt hvis man begynder at oplever problemer inde hos køerne.



STALDSKOLER I SAGRO KVÆG

Så er staldskolerne skudt i gang

Af Kvægrådgiver Charlotte From Katholm

I uge 50 startede vi vores to nye staldskoler for kalve op. Én for danske medarbejdere og én for udenlandske medarbejdere. Der deltog i alt 14 medarbejdere fra 9 forskellige bedrifter. Fagligheden og spørgelysten var i top. Vi havde blandt andet fokus på vigtigheden af råmælk, udfordringer med diarré ved de mindste kalve, lungebetændelse ved større kalve og generelle pladsudfordringer i eksisterende anlæg. Der blev udvekslet masser af erfaringer og de ejendomme besøgene tog udgangspunkt i, fik en masse konstruktive idéer at arbejde videre med.

Vi fortsætter i 2022 og hvis der sidder nogle derude der kunne tænke sig at være med, så giv mig endeligt et kald - Charlotte From Katholm, mobil: 25 57 98 96



KONTAKT

Kvægrådgivere hos SAGRO

[Klik her](#)