



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 11

Indhold

- **MARK**
 - Aktuelt i marken
 - Vækststadier
 - Svampestrategi i vintersæd 2023
 - Raps – svampebekæmpelse og skadedyr
 - Rodukrudt i korn
- **REGLER OG TILSKUD**
 - Ændringsfrist for fællesskema
- **VANDING**
 - Vandingsbehov
 - Fif til at finde tidligere numre af TILVÆKST Salgsafgrøder

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Gødningsbehov & vårsæd

Reducer gødningsmængden hvis du forventer lavere udbytte pga. sen såning.

Vi er nu i starten af maj og derfor er udbyttepotentialet for både vårbyg og havre hastigt på vej ned. Gødningstildelingen bør doceres i forhold til forventet udbytte som 1. maj vil være 15-30 % mindre, mest i havre. Det har særlig betydning for indholdet af protein i maltbyg, med risiko for at få et for højt indhold.

Mangan

Husk mangan, ikke mindst i sent såede marker, som har brug for de mest optimale vækstbetingelser.

Efterse vintersæd for ukrudt

Det er tid til at se efter om der er behov for opfølgende bekæmpelse af ukrudt i vintersæd.

Det kan være rodukudt eller græsser der står pletvis eller f.eks. i forager. Der er midler der må anvendes mod f.eks. nogle græsser efter stadie 32, 2. knæ mærkbart og indtil stadie 39, fanebladet fuldt udviklet og få andre mod rodukudt indtil stadie 45, Fanebladets bladskede opsvulmet. Se mere i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 5.

Vækstregulering

Vintersæden har nået strækingsfasen og der kan vækstreguleres ud fra de anbefalinger som vi skrev om i TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 6.

Husk at overveje om det er nødvendigt at vækstregulere. Der må ikke vækstreguleres i en afgrøde, der er stresset eller ved udsigt til nattefrost. Vækstregulering kan være aktuel, når der er tale om en sort med høj risiko for lejesæd, tidlig såning, meget husdyrgødning, eller hvis afgrøden har en meget kraftig vækst.

Vækststadier

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Vækststadier

Vækststadierne er vigtige både for brugen af mange ukrudtsmidler men også svampemidler.

De vigtigste er listet her, men har du brug for at se alle stadierne så kan de findes [her](#).

Stadie Beskrivelse

- | | |
|----|---|
| 30 | Begyndende strækning |
| 31 | 1. knæ mærkbart |
| 32 | 2. knæmærkbart mindst 2 cm afstand til 1. knæ |
| 37 | Fanebladet er synligt men sammenrullet |
| 39 | Fanebladet er fuldt udfoldet |
| 41 | Fanebladets bladskede begynder at strække sig |
| 45 | Fanebladets bladskede opsvulmet |
| 59 | Akset fuldt gennemskredet |
| 61 | Begyndende blomstring, første blomst åben (ikke nemt at se i byg) |

Svampestrategi i vintersæd 2023

Af planterådgiver Birgit Vestergård

Generelt har svampetrykket indtil nu været moderat i vintersæd. En del fugtelskende svampe forventes dog at bryde frem med lunere vejr. Og med en del nedbørsdage i prognosen, forventes ny smitte. Så det er på høje tid at få finpudset strategien.

Næsten alle svampemidler har begrænsninger i anvendelsen, fx hvor mange gange de må bruges mm. Det er derfor vigtigt - især i modtagelige sorter - at få startet strategisk, så man ikke bliver begrænset ved evt. senere behandlinger.

Højere kornpris = højere indsats?

Høje kornpriser øger rentabiliteten ved svampebehandling. Det er dog først ved en (hvede-) pris på 250 kr./hkg, der har været rentabilitet i følge Landsforsøgene ved at øge doseringsniveauet i forhold til tabellerne i det følgende.

Ved høje kornpriser er der til gengæld ofte betaling for todelte strategier. Men især mod septoria i vinterhvede er det vigtigt at undgå for tidlige behandlinger, omkring stadie 32 (2 knæ mærkbare), hvis der ikke er klart behov. Disse tidlige behandlinger bidrager sjældent meget til slutresultatet. Det skyldes bl.a. at de "slider" på svampe-effekten af senere behandlinger, som er de vigtigste i forhold til merudbyttet.

Aktuelt om midler

Vigtigste nyhed er nok, at Pictor Active er godkendt i byg og hvede. Pictor Active er ikke nogen forbedring i hvedestrategierne, og derfor ikke med i SAGROs forslag i hvede. I byg kan midlet til gengæld være relevant. Det indeholder meget "Comet", og er derfor stærkere mod bladplet, men svagere mod Ramalaria og meget svagere mod meldug end Propulse. En blanding af de to midler har givet merudbytter på niveau med rent Propulse i 2022-forsøgene i byg.

Meldugspecialisten Talius er til gengæld på vej ud af markedet. Det må bruges indtil 1/4 2024. Herefter skal den nye udgave, Talius EC bruges.

Triazolregler

Efter de nye triazolregler, der afhænger af både vækststadium og bejdsetype skal man holde tungen lige i munden. Mht. bejdsning, er det typisk tebuconazol-holdig bejdsere som f. eks Redigo Pro, der tæller med. I tabellerne regner vi kun med, vinterbyg er bejdset med dette triazol.

I FarmTracking og MarkOnline virker triazol-kontrollen, men vel at mærke kun hvis man har tastet afgrøde-stadium og vinket korrekt af m.h.t. bejdsning.

Husk afstandskravene

En del svampemidler har afstandskrav til vand. Dette kan nedsættes til 2 m ved brug af 90 % afdriftsreduktion. Vær også opmærksom på Propulse SE 250 og andre midler med afstandskrav til veje m.m. *ikke* kan nedsættes ved brug af afdriftsreducerende teknik.

Vinterhvede

Skadetærskler og "obs-sorter"

Især i vinterhvede er der målt vigende effekt af svampemidlerne efter for hyppig brug. Undgå især septoria-aktive midler tidligt i sæsonen, hvis behovet er usikkert. De almindeligt dyrkede sorter er heldigvis noget mindre modtagelige for septoria end for blot 3-4 år siden. Behandl derfor kun når skadetærsklerne for de respektive sygdomme er overskredet:

- **Gulrust:** Fra st. 30 (begyndende strækning): ved over 1 % angrebene planter.

Heerup, RGT Stokes, og KWS Extase er de mest modtagelige blandt de almindeligt dyrkede. Indtil nu har vi ikke set gulrust. Husk en gulrust-behandling holder typisk i 14 dage.

- **Meldug:** Til og med st. 31 (1. knæ fremme) 10-25 % planter med angreb. Senere, indtil begyndende skridning: 25-50 % planter med meldug på de 3 øverste blade.

Den aktuelle marks læ forhold, N-niveau eller stress-tilstand betyder mere end sorten, da der er begrænset forskel på sorternes modtagelighed. Talius er bedste middel mod meldug, og da det er uden septoria-effekt, slider det ikke på de septoria-effektive midlers effekt.

- **Septoria** skal behandles forebyggende, pletterne forsvinder ikke, når først de er brudt ud på bladet. Til gengæld er der typisk effekt af svampebehandling 7-10 dage fra smitten er sket. Jo nærmere man kommer tidspunktet for synlige pletter, jo dårligere effekt af behandling.

Sorternes modtagelighed er listet op i tabel 1, der viser "skadetærskler" mht. fugt/nedbør.

Antallet af sammenhængende timer med bladfugt kan følges dagligt på [CropManager.dk](https://www.cropmanager.dk)

Tabel 1 To modeller til beslutningsstøtte for septoria bekæmpelse.

Modtagelighed septoria (0-3)	Sorter	Dage med nedbør (over 1 mm)*	Timer i træk med bladfugt **
1	Heerup, Pondus, Informer, Kvium, RGT Stokes, NOS hvedemix 2220, Wheat Mix Star, <u>WheatMix 221</u>	5 fra st. 37 (fanebladet er synligt)	20 fra st. 37
2-3	Alle øvrige, almindelige sorter inkl. Hvedemix 2022 og NOS hvedemix (der indeholder Dawsum eller RGT Saki)	4 fra st. 32	20 fra st 32

*I st. 45-59 udløser 10 % planter med angreb på 3. øverste fuldt udviklede bekæmpelse uanset model.

**Bladfugt: RH over 85 % eller over 0,2 mm nedbør.

- **Hvedebladplet:** Til og med st. 32 (2. knæ): 75 % angrebne planter. Svampen ses mest i pløjefri hvede med forfrugt hvede eller majs. Her kan den til gengæld udvikles hurtigt, ned til 3 dage fra smitte i varmt vejr. Her er det dog også vigtigt at være "strategisk" og gemme det mest effektive (Propulse) til fanebladsbehandlingen.

Løsningsforslag

Det mest effektive septoria-middel, Balaya bør reserveres til den vigtigste behandling: når fanebladet er fremme. Også i septoria-sunde sorter og sortsblandinger er Balaya aktuel. Ved behandlingsbehov under strækning foretrækkes midler uden septoria-effekt, medmindre der er septoria-risiko. Ved behov for supplerende behandling efter skridning foretrækkes Propulse, hvis midlet ikke allerede er brugt. Se strategier og løsninger i tabel 2.

Tabel 2 Løsningsforslag til svampebehandling i vinterhvede. Husk at sammensætte en plan over sæsonen, så de maximale 100 % triazol ikke overskrides. Reserver 34- 50 % triazol til 0,5 l/ha Balaya på fanebladet. Midler med "kritisk triazol" er med rød skrift. Priser ifølge Middeldatabasen.dk, pr. september 2022

Virksom mod Fed skrift: God virkning	Dosis/ha. Midler adskilt af skræstreg kan erstatte hinanden	Pris - niveau Kr./ha.	Bidrag til triazol-regnskab % (hvede IKKE bejdset med triazol)	Bemærkninger
I: Supplerende behandling under strækning, st. 31-33				
1.Meldug	0,15 Talus EC	70	0	Max 2 gange pr. sæson med min. 14 dage mellem. Bedst virkning på nye angreb.
2.Gulrust, septoria meldug, bladplet	0,2 Comet Pro + 0,2 Proline EC 250/ <u>Proline Xpert EC 240</u>	125-160	0 - 24	Max 2 gange pr. sæson. For Comet P: med 21 dages interval. For Proline X.: med min 14 dage mellem. Comet Pro virker kun mod rust.
3. Septoria, meldug	0,3 Proline/ <u>Proline Xpert EC 240/</u> Juventus 90	85-135	0 - 40	Max 2 gange pr. sæson. For Proline og Proline X.: med min. 14 dage mellem. Juventus virker dårligt mod meldug.
II: "Fanebladsbehandling", st. 37-40				
1.Septoria, rust, meldug	0,4-0,6 <u>Balaya</u>	190-280	27 - 40	Max 1 gang pr. sæson. Ved meget meldug kan der tilsættes Talus eller Proline (tæller begge ikke med i triazol-regnskabet).
2. Bladplet, rust, septoria, meldug	0,4 Propulse SE 250 + 0,2 <u>Proline Xpert EC 240/</u> <u>Prosaro</u>	210-220	6 -19	Max 2 gange pr. sæson. Proline X. og Prosaro: med min 14 dage mellem.
III: Supplerende behandling omkring blomstring, st. 60-61				
1.Rust septoria, meldug, bladplet, fusarium	0,2-0,4 Propulse SE 250 + 0,25 <u>Orius Gold/Folicur</u> <u>Xpert</u>	115-215	12 -20	Max 2 gange pr. sæson. Folicur X.: med min 14 dage mellem. Højest dosis mod bladplet eller ved risiko for aksfusarium.
2.Brunrust, gulrust, septoria, bladplet fusarium	0,2-0,4 Propulse SE 250 + 0,2 Juventus 90	130-200	0	Max 2 gange pr. sæson.



Billede 1. Akksfusarium i vinterhvede. Ses mest efter majs, evt. hvede/tritcale som forfrugt. Fugt omkring blomstring fremmer svampen. For at behandling skal have effekt, skal den ske omkring hvedens blomstring og med relativt høje doser.



Billede 2: Septoria (de store plamager) og hvedebladplet (de små afgrænsede pletter, der er anderledes midt i) på samme blad. Hvedebladplet er værst ved pløjefri 2./flerårs hvede.

Vinterbyg

I vinterbyg har vi ikke set det samme skift mod sundere sorter som i vinterhvede. En todelt strategi vil derfor ofte være aktuel. I år har en del allerede været ude med 1. behandling. En tidlig behandling indeholdende Comet Pro er ofte aktuel ved forfrugt byg og pløjefrit. Her har især bladplet gode betingelser. Behandlingen i slutningen af strækningsfasen med Propulse + Comet Pro/Pictor Active bør prioriteres, da blandingen virker på alle relevante svampe i byg. Herudover kan der suppleres med billigere midler mod andre sygdomme som vist i tabel 3. Husk i denne forbindelse, at der skal gå 3 uger mellem 2 Comet Pro-behandlinger. **Skadetærskler:**

- **Meldug:** 25 % angrebne planter fra st. 32. Alle almindelige sorter er modtagelige, Bordeaux, Comeback og KWS Tardis dog mest.
- **Bygrust:** 10 % angrebne planter fra st. 32. Alle almindeligt dyrkede sorter undtaget LG Globetrotter er meget modtagelige. Valerie er ekstrem modtagelig. Her er bekæmpelse allerede aktuel fra st. 30.
- **Bladplet:** 10 % angrebne planter fra st. 32. Vær især opmærksom hvor der er meget byg stub/halm fra forfrugt i overfladen.
- **Skoldplet:** 10 % angrebne planter og 3 nedbørsdøgn fra st. 31 (der tælles max 14 dage tilbage, og fra st. 32 tælles kun på de 3 øverste blade på hovedskuddet). De fleste sorter er ret modtagelige. Vanding og byg stub/halm i overfladen øger smittetrykket. Bordeaux, Comeback, Valerie, KWS Tardis og KWS Wallace er alle meget modtagelige.
- **Ramularia:** Der findes ingen skadetærskel, og de gængse sorter er alle modtagelige. I 2017 var der større merudbytter for Ramularia, hvilket er sjældent. SDHI-holdige midler (Propulse eller Balaya) foretrækkes og der skal behandles forebyggende. Løsninger med Propulse har givet de højeste nettomerudbytter i se seneste års landsforsøg. Behandling lige før skridning er ofte et godt tidspunkt. Der er efterhånden ret udbredt resistens i

Ramularia mod de gode midler, så en målrettet indsats anbefales ikke.

Tabel 3. Løsningsforslag i vinterbyg. Behandl kun hvis skadetærsklerne for de respektive svampe er overskredet. Midler med "kritisk triazol" er med rød skrift. Priser ifølge Middeldatabasen.dk pr. september 2022

Virksom mod Fed skrift. God virkning	Dosis /ha Midler adskilt af skråstreg kan erstatte hinanden	Pris- niveau kr./ha	Bidrag til triazol- regnskab % (Vinterbyg bejdset med Redigo Pro)	Bemærkninger
I: Supplerende tidlig behandling st. 32-33				
1. Rust, bladplet, skoldplet	0,3 Comet Pro	100	0	Max 2 gange pr. sæson med min 21 dages interval.
2. Meldug, rust skoldplet	0,3 Folicur Xpert EC 240/ Prosaro	85-100	75 - 96	Max 2 gange pr. sæson med min. 14 dage mellem.
3. Meldug, skoldplet, rust, bladplet	0,3 Proline Xpert EC 240	115	28 – 44	Max 2 gange pr. sæson med min. 14 dage mellem.
II: Behandling omkring skridning, st 37-55				
1 Samtlige relevante svampe i byg	0,4 Populse SE 250 + 0,2 Comet Pro	215	0	Max 2 gange pr. sæson. Comet Pro: med min 21 dages interval.
2. Samtlige relevante svampe i byg	0,2 Propulse SE EC + 0,3 Pictor Active	200	0	Max 2 gange pr. sæson. Pictor A.: med min 14 dages interval.
III: Supplerende sen behandling, st. 55-69				
1. Rust	0,3 Orius Gold/ Folicur Xpert EC 240	50-85	22-28	Max 2 gange pr. sæson.



Billede 3 Ramularia i vinterbyg. Propulse og Pictor Active angives at være gode, men der er efterhånden en del resistens i svampen.

Vinterrug

I vinterrug er indsatsbehovet lavt i forhold til de øvrige vintersædsarter. Undtagelsen er dog brunrust, der normalt dog først kommer sent. I år har en del behandlet rug mod skoldplet m.m. omkring 1 maj. Har man allerede behandlet med fx Comet Pro og Proline/Proline Xpert, kan sidste behandling med fordel ske sidst i maj med ca. 0,2 Orius Gold/Folicur Xpert, der begge er gode mod rust. Skadetærskler:

- **Meldug:** Under strækning: 25 % angrebne planter. Herefter, til og med gennemskridning: 50 %. KWS Serafino er resistent mod meldug. De øvrige sorter er mere eller mindre modtagelige og markens læ-forhold, N-forsyningen m.m. er mere afgørende end sortens genetik.

- **Skoldplet:** Fra st. 32 til halv gennemskridning: Efter en fugtig periode og ved angreb, der spreder sig opad. Alle sorter er modtagelige

- **Brunrust:** 10 % angrebne planter frem til st 69 (afsluttet blomstring)

Brunrust er den mest tabsvoldende svamp i rug og alle forslag i tabel 4 har derfor effekt mod rust.

Løsningsforslagene i tabel 5 er som udgangspunkt tiltænkt foderrug. Kan man ikke vækstregulere, på grund af tørke/kulde-stress eller ved brødrug, kan man overveje en todelt-strategi eller lidt højere indsats for at styrke strået.

Tabel 4. Løsningsforslag i vinterrug. Behandl hvis de respektive skadetærskler er overskredet eller for at styrke stået, hvor egentlig vækstregulering ikke er muligt. Midler med "kritisk triazol" er med rød skrift. Priser ifølge Middeldatabasen.dk pr september 2022. Der er her taget udgangspunkt i en enkelt behandling. Ved splitbehandling bruges ca. 0,2 l af midlerne pr. gang.

Virksom mod: Fed skrift: God virkning	Dosis pr ha. Midler adskilt af skræstreg kan erstatte hinanden	Pris- niveau kr/ha	Bidrag til triazol- regnskab % (rug ikke bejdet med triazol)	Bemærkninger
1. Rust, meldug:	0,3 Orius Gold	50	29-90	Max. 2 gange pr. sæson. Højest triazol-bidrag i de tidlige stadier.
2. Rust, meldug skoldplet	0,3 Folicur Xpert EC 240 / Prosaro EC 250	85 - 100	15-72	Max 2 gange pr. sæson med min. 14 dage mellem.
3. Rust, skoldplet	0,3 Comet Pro	100	0	Max. 2 beh. pr. sæson med min. 21 dages interval.
4. Rust, skoldplet, meldug	0,2 Proline EC 250+ 0,2 Comet Pro	145	0	Max. 2 beh. pr. sæson. For Comet P. med min 21 dages interval.



Billede 4 Skoldplet i rug. Modsat i byg dannes der ingen mørk rand omkring pletterne.

Vintertriticale

Alle sorter er modtagelige for gulrust, som er den værste svamp i triticales. Capparicia og Neogen er meget gulrust-modtagelige. Septoria er mindre tabsvoldende end i hvede. Som tommelfingerregel skal der 8-10 nedbørsdage omkring skridning (st. 37-65) til at udløse septoria-alarm i triticales. Altså ca. det dobbelte ift. hvede. Under strækning kan meldug være tabsvoldende i de fleste sorter. Vi foreslår derfor kun midler med fornuftig meldugeffekt under strækningen. Se tabel 5.

Da vi ikke har nogenlunde sikre skadetærskler for triticales, kan man skele til tærsklerne for hvede.

Tabel 5. Løsningsforslag i vintertriticales. Midler med "kritisk triazol" med rød skrift. Priser ifølge Middeldatabasen.dk pr september 2022.

Virksom mod: Fed skrift: God virkning	Dosis pr ha. Midler adskilt af skråstreg kan erstatte hinanden	Pris- niveau kr./ha	Bidrag til triazol- regnskab % (triticales ikke bejdset med triazol)	Bemærkninger
I: Behandling under strækning st. 31-37				
1. Meldug, rust:	0,3 Orius Gold / Folicur Xpert EC 240	50 - 85	36-90	Max. 2 gange pr sæson. For Folicur X. med min. 14 dage mellem.
2. Meldug, rust , septoria	0,3 Prosaro	100	28 - 56	Max. 2 gange. pr sæson med min. 14 dage mellem.
II: Behandling omkring skridning, st 37-61				
1. Rust, septoria, meldug	0,2 Propulse SE 250 + 0,3 Orius Gold	125	15-28	Max 2 gange pr. sæson.
2. Rust, septoria, meldug	0,3 Propulse SE 250 + 0,2 Comet Pro	175	0	Max. 2 gange pr. sæson. For Comet P.: min. 21 dages interval mellem behandlinger.

Raps – svampebekæmpelse og skadedyr

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

De første gule kronblade er begyndt at falde af i mange rapsmarker. Dermed er der risiko for angreb af knoldbægersvamp. Det er derfor tid til første svampebehandling, vi anbefaler mindst én behandling, og eventuelt en anden behandling ca. 14 dage senere. For at beskytte rapsens mange bladhjørner, er det vigtigt at bruge en tilstrækkelig vandmængde, mindst 300 l/ha. Til bekæmpelse benyttes fx 0,35 l/ha Propulse SE 250 + 0,45 l/ha Orius Gold eller fx 0,35 l/ha Propulse SE 250 + 0,3 l/ha Pictor Active eller 0,3 l/ha Pictor Active + 0,45 Orius Gold. Se mere om behandlinger og strategi i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 10**.

Insektbekæmpelse er IKKE en selvfølge. Tværtimod. Selvom der skulle være enkelte skadedyr i rapsen, skal du KUN bekæmpe dem hvis skadetærsklen er overskredet. Hvis du finder 1-2 skulpesnudebiller pr plante, kan bekæmpelse være rentabel, men da midlerne også tager livet af de snyltehvepse der ellers parasittere 30-70% af skulpesnudebillerne, skal behandling kun udføres ved et reelt behov. Samtidig skubber enhver skadedyrsbekæmpelse til resistensudvikling blandt skadedyrene. I Tyskland bekæmper man ikke længere skadedyr i raps, da effekten er for lille grundet resistens.

De gængse midler er kontaktmidler. Da rapsblomsten endnu strækker sig meget (se billede 1), vil effekten kun have få dages effekt før rapsen er vokset så meget at effekten er begrænset.

Til bekæmpelse benyttes 0,2 l/ha Lamdex eller 0,1 l/ha Kaiso Sorbie. Midlerne virker også mod skulpegalmug. Kaiso Sorbie må benyttes én gang i sæsonen og Lamdex 3 gange. Begge midler har bimærke og må derfor kun udbringes mellem ca. 21 og 03, tjek at der ikke er bier i marken.



Billede 5 Vinterraps i blomst. Som det ses, er de nederste blomster afblomstret, men blomstertoppen er endnu ikke færdig med strækning. En skadedyrsbekæmpelse på nuværende tidspunkt vil ikke dække det plantemateriale der endnu ikke er udviklet. Foto: Susanne Frydendal Nielsen, SAGRO.

Rodukrudt i korn

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Bekæmpelse af rodukrudt som tidsler, padderokker, svinemælk og gråbynke bør foretages senest når afgrøden er i vækststadiet 39, fanebladet helt udfoldet, for at undgå skader på kornet, og hvis der anvendes et MCPA-middel, er det ikke godkendt senere end vækststadiet 39. Sprøjt gerne, når der er 15-20 °C og hold helst mindst 14 dages afstand til tidligere ukrudtssprøjtning, for at sikre at rodukruddet er kommet i god vækst. Overvej om du kan nøjes med bekæmpelse i angrebne områder eller yderkanten.

Rodukruddet kan bekæmpes med et MCPA-middel med 1 l/ha, f.eks. Metaxon. Kan evt. blandes med svampemiddel. Tilsætning af ammoniumsulfat og spredklæbemiddel øger effekten mod tidsler og padderokke, især under tørre forhold.

Mustang Forte kan også anvendes med 0,5 l/ha. men kun indtil stadium 32, 2. knæ mærkbart. Læs altid etiketten, Mustang Forte har mange restriktioner, bl.a. vedr. efterfølgende afgrøde og anvendelse af halm.

REGLER OG TILSKUD

Ændringsfrist for fællesskema

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Frem til 23. maj kan man:


- sende ændringer til fællesskemaet, fx ændrer afgrøder, tilføje og fjerne marker. Der kan ændres placering i målrettede efterafgrøder, men ikke tilføjes eller fjernes målrettede efterafgrøder.
- sende fællesskemaet forsinket, men det medfører procentvis nedsættelse i støtten pr. dag det indsendes forsinket, og ikke har været indsendt første gang senest den 28. april.
- søge om slagtepræmie i fællesskemaet.
- søge om ko-præmie i fællesskemaet.

VANDING

Vandingsbehov

Fordampningen ligger i disse dage på 2,5-3 mm fra vintersæd og vinterraps. Hvis vejrudsigten holder, vil især vinterraps og vinterbyg komme i risiko for tørkestress mange steder (se de gule felter i figur 1). Det er derfor tid til at få vandingsmaskinen startet op. Hvis det tørre vejr fortsætter, vil mange afgrøder inden længe have behov for vanding og for at undgå at komme bagud fra start, er det især relevant at starte med vanding i vinterraps og vinterbyg. Raps er særligt følsom for vandmangel under blomstring, mens korn er følsomt under strækning og frem til afsluttet blomstring.

Abonnerer du på FarmTracking har du adgang til cropmanager.dk, begge steder kan du se markernes vandbalance og selv tilføje vandinger.



Figur 1 Vandbalancen for vinterraps, vinterhvede og vinterbyg. Når den grønne graf når det gule felt er der risiko for tørkestress. Figureerne tager udgangspunkt i JB 1 i Holstebroområdet. Fra Cropmanager 2. maj 2023.

Fif til at finde tidligere numre af TILVÆKST Salgsafgrøder

Hvis du ønsker at genfinde noget vi tidligere har skrevet i TILVÆKST, kan du finde listen med alle årets tidligere numre af TILVÆKST Salgsafgrøder [her](#).