



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 17

Indhold

- **MARK**
- Aktuelt i marken
- Svampe og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner og ærter
- Sortsvalg vintersæd og raps 2023-2024
- Sortsblandinger
- Hjemmeavlet udsæd
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
- ÅRRE – Sortsfremvisning og markvandring i forsøg
- ÅRRE – Grøftekantsmøde om hestebønner

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Det er stadig ekstremt tørt, og der vandes, hvor det er muligt. Samtidig giver varmen gode betingelser for bladlusene, som vi også skrev i sidste uge. Et overblik over afgrødernes skadetærskler ses i tabel 1 nedenunder.

Tabel 1 Skadetærsklerne for bladlus i korn, ærter og hestebønner.

Afgrøde	Stadie	Skadetærskel
Korn	73 tidligt mælkemodent kerneindhold	40% angrebne strå 25% hvis der skal svampesprøjtes
	75 fuld kernelængde og mælket, let grynet kerneindhold	100% angrebne strå
	Frem til fuld bælg længde	
Hestebønner	Frem til fuld bælg længde	10-15% angrebne strå
Ærter	Under blomstring	15-20% angrebne planter
	Ved afblomstring og fuld bælg længde	50% angrebne planter

Bekæmpelse af lus kan ske ved 0,2 kg/ha Lamdex eller 0,15 kg/ha Pirimor eller 0,12 kg/ha Teppeki. De to sidstnævnte skåner nyttedyr som fx mariehønsens larve. Skal der bekæmpes andre skadedyr som fx bladrandbiller i hestebønner eller kornbladbiller anvendes 0,2 kg/ha Lamdex.

Svampe i korn

Svampebekæmpelse på nuværende tidspunkt anbefales ikke, da de fleste afgrøder er tørkestressede. Der er dog tilfælde hvor markerne er velvandede kan og fremstår i god vækst. Her kan svampebekæmpelse overvejes. Inden der svampebekæmpes, bør du overveje om der er behov i marken, er tærsklerne overskredne, er sorten modtagelig, skal der bekæmpes bladlus og hvordan er markens potentiale? Det er ikke nødvendigvis alle marker, der skal have sidste svampebekæmpelse, selvom de endnu er grønne og i vækst.

Svampebehandling i varmt vejr medfører risiko for svidninger, med det vejr vi har nu, vil det være svært at undgå

svidning. Svidningerne vil være mindst, hvis der behandles om aftenen. HVIS du vurderer, der er behov for en sidste behandling, kan du benytte 0,25 l/ha Orius Gold eller 0,25 l/ha Comet Pro kan benyttes i vinterhvede.

I vårbyg kan bygrust og bygbladplet være aktuelle at bekæmpe i marker, som pga. vanding eller anden god jordfugt ikke er udfordrede af tørken. Der er generelt kun svage angreb lige nu, men en bekæmpelse udløses ved over 10 % angrebne planter indtil blomstringen er halvvejs. De fleste sorter kan få bygrust, og især RGT Planet og Avenue er modtagelige overfor bygbladplet. Jo senere der bekæmpes, jo lavere dosis er tilstrækkelig. Brug fx 0,15 l/ha Comet Pro + 0,15 l/ha Propulse SE 250. Svampemidler og skadedyrsmidler kan godt blandes.

Svampe og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner og ærter

Af planterådgiver Eva Tine Engelbreth

Hestebønner kan angribes af chokoladeplet, hestebønnebladplet, rust og vikkeskimmel. De senere år har vikkeskimmel, rust og chokoladeplet været mest udbredte. Der er forskel på sorternes modtagelighed af vikkeskimmel.

Bekæmpelse af chokoladeplet og hestebønnebladplet kan være aktuell omkring blomstring i fugtige år, så det burde jo ikke være aktuelt i år, men hold øje. Rust optræder relativt sent og selv relative sene angreb kan være tabsvoldende i hestebønner, og kommer ofte ved varme og tørke. Bekæmpelse af svampesygdomme i hestebønner skønnes nødvendig ved omkring 5-10 procent angrebne planter. Oftest er én behandling omkring slutblomstring nok og bedst rentabel i de fleste tilfælde. Finder man chokoladeplet eller andre sygdomme ved begyndende blomstring bør der behandles mod det allerede der. Og efterfølges af en ny behandling 2 til 3 uger senere ved slut blomstring.

En enkelt behandling er oftest tilstrækkelig, men ved tidlige angreb kan der være behov for 2 behandlinger. I tabel 2 er vist splitbehandling med Pictor Active hhv. Signum WG og med lidt lavere doser. De øvrige løsninger kan også anvendes i nedsat dosis som een af behandlingerne i en split strategi.

Mod vikkeskimmel har Pictor Active og Amistar bedst effekt. Midlerne må anvendes fra vækststadie 51 (første knopper synlige).

I nedenstående tabel 2 vises forskellige behandlingsmuligheder. Vær obs på de nye triazolregler.

Tabel 2 Behandlingsmuligheder mod svampesygdomme i hestebønner. M.A. betyder midlet er godkendt til mindre anvendelse.

Skadegørere	Vækststadie	Løsning	Dosis pr. ha.	Pris	Bemærkninger
Chokoladeplet, hestebønnebladplet, hestebønnerust	61-69	Signum	0,5	310	M.A. Max 2 gange pr. sæson.
Chokoladeplet, hestebønnebladplet, hestebønnerust	65	Signum	0,3 - 0,4	372-496	M.A. Maks. 2 gange pr. sæson og med maks. 0,5 kg/ha pr. gang.
	69	Signum	0,3 - 0,4		
Chokoladeplet, hestebønnebladplet, hestebønnerust	65	Pictor Active	0,3 - 0,4	235-314	M.A. Maks. 2 gange pr. sæson og maks. 0,5 l pr. behandling. Må anvendes til vækststadie 75. Firmaet anbefaler tilsætning af 0,15 l Agropol til Pictor Active.
	69	Pictor Active	0,3 - 0,4		
Chokoladeplet, hestebønnebladplet, hestebønnerust	61-75	Pictor Active	0,5	196	M.A. Maks. 2 gange pr. sæson og maks. 0,5 l pr. behandling. Firmaet anbefaler tilsætning af 0,15 l Agropol til Pictor Active.

Chokoladeplet, hestebønne-bladplet, hestebønnerust	61-69	Pictor Active + Amistar	0,25 + 0,25	157	M.A. Firmaet anbefaler tilsætning af 0,15 l Agropol til Pictor Active. Amistar. Maks. 1 gang pr. vækstsæson og med maks. 0,6 l/ha.
Chokoladeplet, hestebønne-bladplet, hestebønnerust	61-71	Pictor Active + Orius Gold	0,25 + 0,3	150	M.A. Firmaet anbefaler tilsætning af 0,15 l Agropol til Pictor Active.
Chokoladeplet, hestebønne-bladplet, hestebønnerust	61-71	Pictor Active + Folicur Xpert EC 240	0,25 + 0,25	167	M.A. Pictor Active. Maks. 2 gange pr. sæson og maks. 0,5 l pr. behandling. Firmaet anbefaler tilsætning af 0,15 l Agropol til Pictor Active.
Chokoladeplet, hestebønne-bladplet, hestebønnerust	61-69	Amistar	0,5	118	M.A. Maks. 1 gang pr. vækstsæson og med maks. 0,6 l/ha.
Chokoladeplet, hestebønne-bladplet, hestebønnerust	61-69	Amistar + Folicur Xpert EC 240	0,25 + 0,25	128	M.A. Amistar må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Maks. 0,6 l/ha Amistar pr. sæson.
Chokoladeplet, hestebønne-bladplet, hestebønnerust	61-69	Amistar + Orius Gold	0,25 + 0,3	110	M.A. Maks. 0,6 l/ha Amistar pr. sæson.
Hestebønnerust	61-71	Folicur Xpert EC 240	0,5	138	Godkendt til "mindre anvendelse".

Godkendelsen af midlet til mindre anvendelse findes på middeldatabasen.dk, og skal gemmes sammen med sprøjtejournalen.

Skadedyr i hestebønner

Under blomstring er det bedebadlus der skal holdes øje med. Bladrandbiller gør ikke mere skade nu.

Bekæmpelsestærsklen for bedebadlus er 10-15 % planter med bladlus og begyndende kolonidannelse frem til fuld bælg længde. Ved behov for bladlusbekæmpelse anvendes 0,15-0,2 kg pr. ha Pirimor 500 WG, 0,15-0,2 l pr. ha Mavrik eller 0,2-0,25 kg pr. ha Lamdex. Pirimor 500 WG har bedst effekt og foretrækkes, især ved kraftige angreb og skader ikke nyttedyrene. Lamdex må over blomstrende planter kun anvendes uden for biernes flyvetid, dvs. efter ca. kl. 21 og før kl. 03.

Er der bekæmpet mod bladrandbiller, skal man være opmærksom på, hvilke midler der er anvendt og om de må anvendes igen. Pirimor 500 WG må maks. anvendes 1 gang pr. vækstsæson, Mavrik må maks. anvendes 2 gange pr. vækstsæson, og Lamdex må maks. anvendes 3 gange pr. vækstsæson.

Svampe i ærter

Ærter kan angribes af ærtesyge og gråskimmel, som fremmes af fugtige forhold omkring blomstring. Fra før blomstring kan der også optræde angreb af ærteskimmel. Ingen af de godkendte svampemidler har god effekt på disse sygdomme. Se løsningsforslag, hvis svampebekæmpelse undtagelsesvis er aktuelt, jf tabel 3.

Amistar, Mirador 250 SC og Ortiva Top må maksimalt anvendes 1 gang pr. sæson. Den lave dosis af Signum WG kan anvendes, hvis behandlingen deles i to. Køreskaden i ærter omkring blomstring er ca. 1,5 procent af udbyttet med en 24 meter marksprøjte.

Der anbefales omkring 200 l vand pr. hektar og mest ved sprøjtning på tørre planter. F.eks. kan der anvendes 025 refleks/lavdriftdyse 3,5 atm. og 6,5 km/t eller 030 refleks/lavdriftdyse, 3,0 atm. og 7,0 km/t eller 040 refleks/lavdriftdyse, 2,0 atm. og 8,0 km/t.

Tabel 3 Løsningsforslag til svampebekæmpelse i ærter.

Skadegørere	Afgrødestadium	Løsning	Dosis pr. ha	BI	Pris	Bemærkninger
Ærtesyge	St. 65-69	Amistar	0,5	0,5	118	Udbringningstidspunkt omkring blomstring. Kun moderat effekt kan forventes. Maks. 0,6 l/ha pr. vækstsæson og maks. 1 beh. pr. sæson. Behandlingsfrist er st. 69.
Ærtesyge	St. 65-69	Mirador 250 SC	0,5	0,5	118	Udbringningstidspunkt omkring blomstring. Mirador 250 SC er identisk med Amistar. Kun moderat effekt kan forventes. Maks. 0,6 l/ha pr. sæson og maks. 1 behandling pr. sæson. Behandlingsfrist er st. 69.
Gråskimmel, ærteskimmel	St. 65-69	Signum	0,3 - 0,5	0,40-0,67	177-295	Udbringningstidspunkt omkring blomstring. Kun moderat effekt kan forventes. Laveste dosis ved delt behandling. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Behandlingsfrist er 21 dage før høst.
Ærtesyge	St. 65-69	Ortiva Top	0,5	0,4	295	Udbringningstidspunkt omkring blomstring. Kun moderat effekt kan forventes. Maks. 1 behandling pr. år. Behandlingsfrist er st. 77 og 14 dage før høst.

Skadedyr i ærter

Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus er 15-20 procent angrebne planter, og ved afblomstring og fuld bælg længde over 50 procent angrebne planter. Bladlusene sidder ofte gemt omkring knopanlæggene i topskuddene

Sprøjtefristen for Pirimor 500 WG er 3 dage med 0,1 l pr ha, (st. 88). Mavrik (st. 79) med 0,125 kg pr ha, og Lamdex har en sprøjte frist på 7 dage, med 0,2 l pr ha.

Sortsvalg vintersæd og raps 2023–2024

Af planterådgiver Susanne Frydendal Nielsen

Sortsvalget afhænger af mange faktorer, vi har i dette nummer samlet de sorter der forhandles i år. For at lette sammenligningen er data samlet på tværs af forhandlere med data fra landsforsøgene. Under hver afgrøde er en mindre tabel med de sorter der nævnes, og en printvenlig samling af alle sorter kan ses i boksen lige herunder.

Vinterraps

Fokus ved valg af rapssort

- Et stort og stabilt udbytte af frø af standardkvalitet gennem flere års forsøg
- Passende højde ved høst
- Tolerance overfor rapsrødsot
- Skulpeopspringsresistens, og dermed mindre dryssetab.
- Pris på udsæd og behov for planteværnsindsats (vækstregulering) i vækstsæsonen

Udbyttet i 2022 var mere jævnbyrdige end i 2021 hvor variationen var større. LG Avrion og LG Aukland har højeste udbytter over en treårig periode, mens Turing havde det højeste udbytte i 2022. Højeste olieprocent findes i sorterne PT299 og Croissant. Croissant er en ny sort med kålbroktolerance. Selvom du vælger en sort med tolerance overfor kålbrok, må du aldrig gå på kompromis med, at der skal være 5 rapsfrie år i sædskiftet.

Der er to linjesorter, den velkendte Butterfly samt nye Anton, der dog ikke har været i landsforsøgene endnu.

Tabel 4 Udvalgte rapssorter og deres udbytte samt øvrige kvalitetsparametre, baseret på sortinfo samt forhandlernes oplysninger. Se samtlige sorter i den samlede tabeloversigt.

	Frøudb. forholdstal				Pct. olie i tørstof (% af tørstof)	Afgrøde-højde ved høst (cm)	Tolerance		Resistens mod skulpeopspiring	Egnet til såning			Forhandler
	Gns	2022	2021	2020			Rapsrødsot	Kålbrot		Tidlig	Middel	Sen	
Blanding	100	100	100	100	51,3	137							
LG Aviron	108	99	111	115	50,6	136	x		x		x	x	ATR
LG Auckland	107	99	110	112	51,2	141	x		x		x	x	VA
KWS Heikos	105	104	106	-	51,8	161			x	x			HK, N&S, Ewers
Turing	105	105	104	-	50,5	138			-		x	x	VA
PT299	104	98	107	106	53	141			-		x	x	Ewers
Croissant	100	100	-	-	53	145	x	x	-		x		Ewers

HK: Hornslyd købmandsgård, N&S: Nielsen & Smith, VA: Vestjyllands andel.

Klik i boksen herunder for at se hele sortstabellen.

Vinterhvede

Udover et højt, stabilt udbytte er også sygdomsmodtageligheden interessant når der vælges hvede sort. Afhængig af om hveden skal bruges til foder eller på anden vis betaler for proteinindholdet, kan det også være en vigtig faktor.

Den nye sort Guinness havde højeste udbytte i 2022, men har kun været med i landsforsøgene i det ene år. RGT Stokes og Pondus ligger højt set over de seneste tre år. Råproteinindholdet er omvendt korreleret med udbyttet, så sorter med højt udbytte tenderer til lavere råproteinindhold.

Til tidlig såning anbefales sorterne Pondus, Heerup, DLG Wheat Mix Star, Bright, Champion, Guinness, Kvium, LG Initial, Mascula, RGT Saki og RGT Stokes.

Sortsblandinger er blevet en stor "sort" de seneste år, i tabel 9 ses hvilke sortsblandinger der udbydes i år, samt hvilke sorter der indgår. Nogle sortsblandinger er også undersøgt i landsforsøgene og deres kvalitetsparametre kan ses i tabellerne med alle sorter.

Tabel 5 Udvalgte hvedesorter og deres udbytte samt øvrige kvalitetsparametre, baseret på sortinfo samt forhandlernes oplysninger. Se samtlige sorter i den samlede tabeloversigt.

	Kerneudb.(fht)				Merudb for svampe-bek (hkg/ha)	Hekto-liter-vægt (kg/hl)	Rå-protein i tørstof (%)	Modning efter KWS Extase	Strå-længde (cm)	Modtagelighedsgruppe (0-4)*						For-handler
	Gns	2022	2021	2020						Meldug	Septoria	Brunrust	Gulrust	Hvedebladplet	Fusarium i aks	
Blanding	100	100	100	100	3,2	79	9,6	1	90	-	-	-	-	-	-	
Guinness	105	105	-	-	4	78,6	9,5	2	94	1	2	2	0	1	2	DLG
RGT Stokes	105	101	109	-	5,5	77,9	9,2	4	83	1	1	2	2	1	3	DLG
Pondus	104	102	104	107	5,6	78	9,4	4	86	2	1	3	0	1	2	DA, Ewers
Champion	104	103	101	107	8,7	76,9	9,3	1	81	3	2	3	1	2	3	DLG

DA: Danish Agro, VA: Vestjyllands andel.

Klik i boksen herunder for at se hele sortstabellen.

Rug

KWS-sorterne Igor, Rotor, Tayo og Berado ligger udbyttmæssigt i top over de seneste tre år. Sidste år var SU Glacia og SU Arvalus højdespringere, men set som et gennemsnit falder de lidt ned, da de i 2021 lå lavere.

Niveauet med meldrøjere varierer fra år til år. Aarhus Universitet lavede tests af nogle sorter som blev kunstigt smittet i 2021 og 2022. I forsøgene indgik sorterne KWS Tayo, KWS Berado, KWS Igor, KWS Rotor, KWS Jethro, og resultaterne lå mellem 9-15 meldrøjere pr. 100 aks i 2022 og 12-21 meldrøjere pr. 100 aks i 2021. I 2021 indgik nogle SU-sorter, men ikke de sorter der udbydes til salg i år. Tendensen var at SU-sorterne har højere andel meldrøjere, uden at det kan konkluderes at være tilfældet for de SU-sorter der kan købes i år.

Tabel 6 Udvalgte vinterrugsorter og deres udbytte samt øvrige kvalitetsparametre, baseret på sortinfo samt forhandlernes oplysninger. Se samtlige sorter i den samlede tabeloversigt.

	Kerneudb. (fht)				Merudb. for svampebek. (hkg/ha)	Hekto- liter- vægt (kg/hl)	Rå- protein i tørstof (%)	Leje- sæd (0 - 10)	Type	Frem- avis- areal	Modtage- ligheds- gruppe (0-4)			For- handler
	Gns	2022	2021	2020							Skoldplet Brunrust	Meldrøjer		
Blanding	100	100	100	100	3,5	77,2	8,8	0,8			-	-	-	
KWS Igor	104	103	103	107	1,3	76,0	8,8	1	Hyb	285	2	2	2	DLG
KWS Rotor	104	103	103	107	2,4	75,2	8,2	1,8	Hyb	241	2	2	2	DA, VA
KWS Tayo	103	100	103	106	2,8	76,6	8,9	0,8	Hyb	572	2	2	2	DLG
KWS Berado	102	102	100	104	4,3	77,9	8,6	0,8	Hyb	343	2	3	2	DA, VA
SU Glacia+10% population	102	105	99	-	3,4	76,8	8,7	1,6	Hyb		2	-	-	Ewers
SU Arvalus+10% population	102	105	98	-	3,2	77,9	9,0	0,8	Hyb		2	-	-	HK, N&S

HK: Hornsyld købmandsgård, N&S: Nielsen & Smith, DA: Danish Agro, VA: Vestjyllands andel.

Klik i boksen herunder for at se hele sortstabellen.

Vinterbyg

Fokus ved valg af vinterbyg

- Et højt, stabilt udbytte
- Lav sygdomsmodtagelighed
- 2 eller 6-radet sort
- Hybrid eller linjesort
- Højt energiindhold til svinefoder

I år er to nye 2-radede sorter, NOS Contador og Orcade med i toppen udbyttmæssigt sammen med 6-radede hybrider (Jettoo, SY Scoop, SY Dakoota, SY Loona).

Hybridsorter er dyrere end linjesorter og derfor mest interessant, hvis der skal sås tidligt (og dermed bruges mindre udsæd). Men vær opmærksom på, at tidlig såning øger ukrudtsmængden og bør undgås, hvis du dør med græsukrudt. Vi har ikke se de samme fordele ved sortsblandinger i byg som ses i hveden.

Tabel 7 Udvalgte vinterbygsorter og deres udbytte samt øvrige kvalitetsparametre, baseret på sortinfo samt forhandlernes oplysninger. Se samtlige sorter i den samlede tabeloversigt.

	Kerneudb.(fht)				Merudb. for svampebek (hkg/ha)	Hekto-liter-vægt (kg/hl)	Rå-protein i tørstof (%)	Type*	Frem-avls areal**	Modtageligheds-gruppe (0-4)***				For-handler
	Gns	2022	2021	2020						Meldug	Bygrust	Skoldplet	Ramularia	
Blanding	100	100	100	100	3,2	70,4	10,3		0	-	-	-	-	
NOS Contador	106	106	-	-	4,2	68,7	9,5	2rd	0	2	1	-	2	DA
Jettoo	106	104	107	106	8,6	67,6	10,3	6rd, Hyb	97	2	3	2	1	DLG
SY Scoop	106	105	106	-	9,5	68,3	10,4	6rd, Hyb	50	2	3	-	2	DLG
Orcade	105	105	-	-	2,8	69,9	10,4	2rd	50	1	0	-	2	DA, VA
SY Dakoota	104	104	104	-	11,1	69,5	10,6	6rd, Hyb	92	1	3	-	2	DA, VA
SY Loona	104	104	-	-	10,0	70,7	10,2	6rd, Hyb	10	-	-	-	-	Ewers

DA: Danish Agro, VA: Vestjyllands andel.

Klik i boksen herunder for at se hele sortstabellen.

Triticale

I mange år har der kun været begrænset udvikling på triticale, men i år udbyder Danish Agro sorten Lumaco. Den har kun været i landsforsøgene i 2022, men havde et udbytte på forholdstal 109, mod den eneste anden udbudte sort, Trias, som lå på 100 i forholdstal. Lumaco er 9 cm højere, men blev i 2022 stort set ikke angrebet af sygdomme.

Fra 2023 blev der regler om at 35% af dit areal, skal tilsås med en anden afgrøde i forhold til, hvad der var i arealerne i det foregående år. Her kan triticales benyttes til at variationen.

Tabel 8 Triticalesorter og deres udbytte samt øvrige kvalitetsparametre, baseret på sortinfo samt forhandlernes oplysninger. Der udbydes ikke andre sorter end de to nævnte.

	Udbytte forholdstal				Hektoliter-vægt (kg/hl)	Råprotein i tørstof (%)	% dækning				Strå længde (cm)	Lejesæd (0 - 10)	Fremavis-areal (ha)	Forhandler
	Gns	2022	2021	2020			Meldug	Septoria	Gulrust	Gulrust i aks				
Blanding	100				74	10,1	12	10	0,92	3,7	118	0	-	
Lumaco	109	109	-	-	75,2	10,1	0	2,4	0	0	121	0,3	38	DA
Trias	98	100	101	92	74,4	10,1	13	13	0	3,3	112	0	59	DLG

I modsætning til de øvrige tabeller viser denne sygdomsdækningen, da der ikke var data på modtagelighedsgrupperne.
DA: Danish Agro

Klik i boksen herunder for at se hele sortstabellen.

Sortsblandinger

Af planterådgiver *Susanne Frydendal Nielsen*

Sortsblandinger vinder frem. De koster normalt et lille ekstra beløb for at få blandingen, men normalt er de også lidt mindre angrebne af sygdomme.

Der tilbydes i år en række sortsblandinger af vinterbyg og især vinterhvede. Se blandingerne i tabel 9.

Brug oversigterne over sorterens karakterer i det foregående afsnit, du vil hurtigt bemærke at det generelt er gode og højt ydende sorter der er brugt i sortsblandingerne. Sortsblandinger er attraktive alternativer til de rene sorter, hvis du dyrker foderkorn, da de giver en større dyrkningssikkerhed og lavere sygdomsmodtagelighed end sorter dyrket hver for sig.

Tabel 9 Oversigt over sortsblandinger fra forhandlerne af hhv. vinterbyg og vinterhvede, samt hvilke sorter de indeholder. Sortblandingerne indeholder samme mængde af hver sort, medmindre andet er nævnt.

	Sorter				Forhandler
Vinterhvede					
HK-hvedeMIX 2022	Pondus	KWS Dawsum	RGT Bairstow		HK, N&S
DLG Wheat Mix Star	Kvium	Heerup	RGT Stokes		DLG
NOS Hvede Mix 2220	Pondus	Informer	RGT Bairstow		DA
VA sortsblanding	Pondus	Informer	RGT Saki		VA
NOS Hvede Allround Mix	Pondus	Informer	Momentum		
DLG Wheat mix Premium	Mascula	Heerup	RGT Stokes		DLG
DLG Wheat mix Top Yield	Guinness	Heerup	RGT Stokes		DLG
DLG Wheat Mix Bread	LG Initial	Bright	KWS Extase		DLG
Sortsblanding 3078	50% Pondus	25% Kubik	25% WPB Ennis		DA
Sortsblanding 3088	SU Fiete	SY Volley	RGT Bairstow	LG Skyscraper	Ewers
Vinterbyg					
DA Sortsblanding	Bordeaux	NOS Contador	LG Globetrotter		DA
DLG Barley mix	Alaska	KWS Tardis	Cleopatra		DLG

Hjemmeavlet udsæd

Af planterådgiver *Susanne Frydendal Nielsen*

Det er tilladt at anvende egen udsæd af kornarterne. Udsæden skal være dyrket på egen bedrift, og der må ikke handles eller byttes med naboen eller andre landmænd. Desuden skal der naturligvis betales forædlerafgift til Danske Sorts-ejere (sortsejere.dk). Det koster 50-60 kr. pr. ha, afhængigt af sorten.

Hvis du selv laver blandingerne, bør de blandes godt, men sortsblandingseffekten opnås også, selvom der bliver områder i marken, hvor der kun er én sort.

ARRANGEMENTER OG KURSER

ÅRRE – Sortsfremvisning og markvandring i forsøg

Kom med til en spændende aften i forsøgsmarken

Tirsdag den 20. juni kl. 19.00-22.00

Ved Harsø Maskiner A/S, Fåborgvej 5, 6818 Årre – marken er synlig fra Tingvejen

Læs mere på sagro.dk

ÅRRE – Grøftekantsmøde om hestebønner

Mandag den 26. juni kl. 10.00 - 12.00

Fåborgvej 5, 6818 Årre

Vi mødes i marken med hestebønneforsøg.

Læs mere på sagro.dk - husk tilmelding senest 21/6.