



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 6

Indhold

- **MARK**
- Aktuelt i marken
- Sådan bruger du din gylle bedst
- Ukrudt i hestebønner
- **REGLER OG TILSKUD**
- IPM-skema

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Niels Holmgaard

Vi ser generelt god effekt af de udførte ukrudtsbekæmpelser der er udført i vintersæden. Rigtig mange marker har et meget lille behov for opfølgning mod græsser og overvintrende ukrudt. Tilpas derfor dosis efter ukrudtstryk og størrelse.



Billede 1 viser god effekt af efterårets ukrudtsbehandling, men også tydelig manganmangel midt i billedet (Foto: Mads Moesby, SAGRO).

I vinterbyg er der observeret skoldplet i pløjefri marker etableret efter byg. To-radede sorter er generelt mere modtagelige for pletsvampe end seks-radede. Det er endnu for tidligt at bekæmpe, men hvis du har en to-radet vinterbygmark, der er etableret pløjefrit efter byg, bør du overvåge den nøje. Den seneste uges nedbør øger risikoen for smittespredning. Bekæmpelse anbefales ved over 10 % angrebne planter og mindst tre dages nedbør. Ved tidlig bekæmpelse anbefales 0,25 l/ha Comet Pro, som tidligst må anvendes i vækststadie 30.

Sådan bruger du din gylle bedst

Af planterådgiver Finn Poulsen

Foråret er over os. Der er begyndende travlhed i mange områder og gyllekørslen er godt i gang. Gylle er en god gødningskilde, men det er ikke alle former for udbringning der giver lige god næringsstofudnyttelse. Specielt kvælstofdelen kan udnyttes for ringe ved uhensigtsmæssig udbringning.

Tidlig udbringning af gylle i vinterafgrøder – fordele og ulemper

Fordele:

- Lavere temperaturer reducerer lugtgener og ammoniaktab
- Gødningen er tilgængelig, når afgrøden har behov for den

Ulemper:

- Risiko for køreskader og dårlig jordstruktur
- Øget risiko for nitratudvaskning, især på sandjord

Vær opmærksom på vejrforholdene og kør på afgrøder i vækst. Prioritér udbringning under kølige, fugtige og vindstille forhold – særligt ved tørstofrig gylle og afgasset biomasse.

Gylle til vårafgrøder

- Udbring gyllen så tæt på såtidspunktet som muligt
- Nedfældning er at foretrække frem for slangeudlægning af forsuret gylle – især ved tørstofrig, afgasset biomasse

Effekt af nedfældning

Nedfældning før såning giver markant højere udbytte end slæbeslanger i den etablerede afgrøde. Forsøg viser et merudbytte på ca. 8 hkg kerne/ha ved nedfældning frem for slæbeslanger efter fremspiring. Slæbesko giver en mindre fordel (+2 hkg/ha), men kan heller ikke matche effekten af nedfældning før såning.

Hvornår skal såning prioriteres over gyllekørsel?

Fra slutningen af april kan det i visse tilfælde betale sig at så frem for at vente på en gyllevogn – fx hvis:

- Kun en mindre del af marken ikke kan bære en gyllevogn
- Udsigt til ustabil vej kan forsinke såningen yderligere

frem for at vente på en gyllevogn. Det kan f.eks. være hvis det kun er den mindre del af marken der ikke kan bære en gyllevogn eller der er udsigt til ustabil vej som yderlig kan skubbe såtidspunktet.

Ukrudt i hestebønner

Af planterådgiver Eva Tine Nissen Engelbreth

Såningen af hestebønner skal gerne være afsluttet eller godt i gang pt. Allerede nu bør ukrudtsstrategien overvejes da den bedste bekæmpelse af ukrudt er før fremspiring af hestebønnerne.

Bekæmpelse før fremspiring

Der er tre godkendte jordmidler, som kan anvendes. Jordmidlerne kan anvendes efter såning og frem til før fremspiring af hestebønner. Midlerne virker bedst på fugtig jord, men undgå sprøjtning ved udsigt til kraftig nedbør efter udbringning.

Fenix med 1 l pr. ha vil oftest være en tilstrækkelig ukrudtsstrategi. Er der kommet ukrudt op før fremspiringen af hestebønnerne, oftest i fugtige år, kan tilsætning af 1 l glyphosat være en fordel. Fenix har en rimelig god og bred effekt og har relativ god effekt mod spildraps.

Centium 36 CS / Clomate kan senest før fremspiring anvendes i en dosering på 0,20-0,25 l pr. ha og har god effekt mod burrester, fuglegræs, tveand, ærenpris og hyrdetaske.

Novitron DAM TEC indeholder aclonifen og clomazon, som er aktivstofferne i henholdsvis Centium 36 CS og Fenix. 1,2 kg Novitron svarer til 1 l Fenix + 0,1 l Centium. Midlet har god effekt mod burrester, fuglegræs, vellugtende kamille, bleg- og ferskenpileurt, korsblomstret ukrudt, tveand og ærenpris, samt rimelig effekt mod agerstedmoder, enårig rapgræs, hvidmelet gåsefod, snerlepileurt og vejpileurt.

Ved direkte såning før fremspiring

Når hestebønner sås med skiveskær direkte i en nedvisnet stub eller efterafgrøde, vil der normalt kun ske fremspiring af ukrudt i et smalt bånd langs sårillen. Lidt ukrudt tæt på hestebønnerne i rækken får god konkurrence af afgrøden. Her vil nedvisningen før såning ofte være en tilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse.

Efter fremspiring

Efter fremspiring kan der også bekæmpes ukrudt, men det er ikke nær så effektivt. Derfor er det kun en nødløsning at anvende Basagran SG og Stomp CS efter fremspiring af hestebønnerne på tokimbladet ukrudt.

Til gengæld, hvis der er problemer med fx kvik, alm. rajgræs, italiensk rajgræs og agerrævehale, er både Agil 100 EC og Focus Ultra godkendt til dette formål i hestebønner.

REGLER OG TILSKUD

IPM-skema

Husk at udfylde IPM spørgeskemaet inden 1. april