



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 20

Indhold

- **AKTUELT I MARKEN**
 - Lus
 - Gulrust i vårhvede
 - Flyvehavre
- **REGLER OG TILSKUD**
 - Nedvisning af rodukrudt før høst
 - Slåning, afpudsning og slet af græsarealer
- **VANDING**
 - Vandingsmaskinerne kører igen

AKTUELT I MARKEN

Lus

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Vi ser nu lus over bekæmpelsestærskel i en del havremarker. Vejret er godt for lus, så det er vigtigt at se efter, om der er behov for bekæmpelse. Lus forventes også i andre afgrøder, med det lune og tørre vejr vi har nu.

Behandl kun hvis bekæmpelsestærsklen er overskredet, da overflødige behandlinger med stor sikkerhed genererer mere resistens.

Bekæmpelsestærskler for lus i hvede, vårbyg og havre:

- Frem til og med vækststadie 73, tidlig mælkemodent vækststadie: 40 % angrebne strå, hvis der ikke er behov for svampebekæmpelse
- Frem til og med vækststadie 73, tidlig mælkemodent vækststadie: 25 % angrebne strå, hvis der samtidig er behov for svampebekæmpelse
- Fra vækststadie 74 – 75, alle kerner har fuld størrelse, grønne kerner: 100 % angrebne strå.

Bekæmpelsesforslag i korn:

1. 0,1 kg/ha Pirimor 500 WG. Pirimor er skånsom mod nyttedyr. Midlet har "dampvirkning", hvilket gør den velegnet i vårbyg, hvor lusene sidder i bunden af afgrøden.
2. 0,1 kg/ha Teppeki. Teppeki er i risiko for at blive afmeldt pga. PFAS-indhold, så det anbefales at få det brugt, hvis det er i dit kemi-rum. Vi kender p.t. ingen eksempler på resistens mod dette middel.
3. 0,15 kg/ha Lamdex eller 0,075 kg/ha Kaiso Sorbie. Begge midler har bimærke, og dræber de fleste insekter i marken.
4. 0,1 l/ha Mavrik, der er uden bimærke, men virker mod en del andre insekter

Bekæmpelsestærskler for lus i ærter og hestebønne:

- Ærter: 10-15 % angrebne i blomstringen og 50 % angrebne planter ved afblomstring og fuld bælg længde.
- Hestebønner: 10-15 % planter med bladlus og begyndende kolonidannelse frem til fuld bælg længde.

Bekæmpelsesforslag i Ærter og hestebønner:

1. 0,125 kg/ha Pirimor 500 WG. Pirimor er skånsom mod nytte dyr.
2. 0,2 kg/ha Lamdex
3. 0,1 l/ha Mavrik, der er uden bimærke, men virker mod en del andre insekter

OBS! Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister.

Gulrust i vårhvede

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Har du vårhvede, er det vigtigt at holde øje med gulrust nu. Gulrust skal i modtagelige sorter, bekæmpes ved forekomst. Læs mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 15**.

Flyvehavre

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Flyvehavre ses nu fuld gennemskredet rundt omkring. Husk at få markerne, også brakarealer mfl. gået igennem og få afluget, hvis der er noget. Læs mere i **TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 16**.

REGLER OG TILSKUD

Nedvisning af rodukrudt før høst

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Læs altid etiketten, det er dit ansvar.

Nedvisning med et glyfosatholdigt produkt må kun ske i foderafgrøder som pletsprøjtning og det skal fremgå af etiketten. Hvor meget der må nedvisnes, fremgår ikke tydeligt, men kan være et mindre område af marken og kun der hvor der er rodukrudt.

Ved et kontrolbesøg, skal det kunne sandsynliggøres at der er tale om pletvis bekæmpelse af flerårigt rodukrudt. Der lægges vægt på at der skal forefindes og fremvises nedvisnet flerårigt ukrudt. Det skal ligeledes kunne ses at der er nedvisnet i sektioner.

I sprøjtejournalen skal der noteres at det er en pletsprøjtning og det behandlede areals antal ha. noteres.

En måde at have en dokumentation på, kan være ved at tage billeder med Appen "Jordbrugsfoto" se figur 1. som kan hentes til din mobiltelefon. Når du anvender den, bliver dine billeder taget med en præcis position og kan gemmes i arkivet. F.eks. ved grønkorn som der kan opstå tvivl om hvorvidt der har været omlagt med korn og mange andre muligheder.



Jordbrugsfoto
Styrelsen For Grøn Ar...

Installer



Figur 1 Hent appen "jordbrugsfoto" til din mobiltelefon.

Slåning, afpudsning og slet af græsarealer

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger på arealer med græs, der ikke er inde i en eller anden ordning, uanset om det er med eller uden N-kvote, omdrift eller permanent græs.

Så snart der er en ordning af en eller anden art, er der som regel restriktioner på. Her er det nødvendigt at vide hvilken ordning dine arealer er inde i.

- Marker med tilsagn med "Pleje af græs med slet" må tages slet på fra 20. juni, medmindre andet fremgår af tilsagnet.
- Småbiotoper må typisk ikke slås af, kun hvis der kun søges grundbetaling. Tæller småbiotopen for GLM 10 brak eller Biodiversitet og bæredygtighed må de ikke slås af.
- Brakarealer har generelt slåningsforbud i perioden fra og med 1. maj, til og med 31. juli. Slåningsbrak skal slås af i april og/eller i perioden 1. august til 15. september. Det kan nås indtil 25. oktober, men så skal der dokumenteres for afslåning.
- Blomster- og bestøverbrak har ikke krav på afslåning, men skal ny-etableres hvert andet år, senest 30. april.

Det er vigtigt at du kender dine muligheder og pligter. Er du i tvivl om status på dine arealer, kan du kontakte din planterådgiver.

VANDING

Vandingsmaskinerne kører igen

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Vandingen er i fuld gang mange steder i vores område. Nedbøren i den sidste uge har varieret mellem 0 og 30 mm. Justér vandingsbehovet ud fra dine egne målinger.

Det er vigtigt at sikre vandforsyningen frem til 3–4 uger før forventet høst. Vandbehovet aftager en smule i den sidste fase, men vandmangel under kerne-/frøfyldning bør undgås, da det nedsætter kernevægten.

Hvornår kan vanding afsluttes i korn og vinterraps?

I korn kan vanding afsluttes, når afgrøden er i vækststadie 85, kernes indhold blødt, men tørt (dejmodenhed), aftryk af en fingernegl i kernen forsvinder igen, hvis der stadig er ca. 50 % tilbage af det plantetilgængelige vand, dvs. et vandunderskud på 30 mm. på grovsandede jorde.

I vinterraps kan vanding afsluttes ved begyndende gulfarvning af skulper, hvis der stadig er ca. 50 % tilbage af det plantetilgængelige vand, dvs. et vandunderskud på 30 mm. på grovsandede jorde.

Undgå lejesæd ved vanding

Når der vandes i afgrøder der står godt og tæt, så er der risiko for at afgrøden slås ned af vandstrålen. Hestebønner kan knække helt ned. Hold øje under vanding og juster på dysens tryk hvis nødvendigt.