



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 1

Indhold

- **MARK**
- Aktuelt i marken
- Udbringning af husdyrgødning og afgasset biomasse
- Brug nitrifikationshæmmer ved tidlig gylleudbringning
- **REGLER OG TILSKUD**
- Fjernelse af læhegn eller andet i det åbne landskab
- Vigtigste frister for indsendelser i foråret 2026
- Flydende husdyrgødning - regler, teknik og forsuring
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
- Aktuelle kurser

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Her først i februar 2026 har frosten et godt tag i jorden og vejrudsigten giver ikke håb om snarlig vækststart eller mulighed for meget tidlig såning.

Tiden kan bruges til forberedelser. Noget af det der først kan blive aktuelt, er at sprøjte mangan ud på vintersæd, som står på tør jord og kan blive udfordret af manganmangel. Gødskning af vintersæd med handelsgødning skal vente til vækststart, og det vil vare noget tid endnu.

Noget andet kan være at få styr på kemirummet og få gjort op om du har det kemi, der vil blive behov for. En lang række midler har allerede fået salgsforbud og andre vil følge efter her sidst i februar 2026.

De midler, du kan nå at købe, kan du se i figur 1, men det haster, hvis det skal være klar til at udlevere til dig inden udgangen af februar.

Figur 1. Planteværnsmidler der får salgsforbud pr. 28. februar og som pr. 30 november 2026 ikke må anvendes eller opbevares. Køb ikke mere end du får brug for. Der er alternativer, men de er typisk ikke så gode og koster mere. Kilde: SEGES.

	Produktnavn (reg.nr.)	Salgsforbud efter	Opbevarings- og anv. forbud efter
diflufenican	DFF (18-416),	28. februar 2026	30. november 2026
	Sempre (1046-5),	28. februar 2026	30. november 2026
	Legacy 500 SC (396-26)	28. februar 2026	30. november 2026
	Mateno Duo SC 600 (18-631)	28. februar 2026	30. november 2026
flonicamid	Teppeki (352-5), Afinto (352-19)	28. februar 2026	31. august 2026

Se den fulde liste herunder

Udbringning af husdyrgødning og afgasset biomasse

Af planterådgiverne Vivi Ernsten og Thomas Harbo

Pr. 1. februar ophører lukkeperioden for udbringning af organisk gødning (husdyrgødning og afgasset biomasse) og mineralsk handelsgødning. Afgrøderne har ikke behov for næringsstofftilførsel nu, så udbringning bør alene ske, hvis lagrene er fyldte. Vær opmærksom på reglerne for udbringning, herunder forholdene i marken.

Lovlig udbringning fra 1. februar?

Fra 1. februar kan husdyrgødning lovligt udbringes på de fleste arealer. Lukkeperioden for udbringning ophører pr. 1. februar, og ifølge de generelle regler må der, hvis forholdene tillader det, udbringes husdyrgødning på alle afgrøder dog med iagttagelse af kravene til udbringningsteknik.

Indimellem kan der være tvivl om, hvorvidt en udbringning sker lovligt, og mange uden for erhvervet ser det som deres pligt at anmelde, hvad de ser som "tvivlsomme" udbringninger. Kommunerne skal reagere på anmeldelser. Inden du kører, skal du derfor være sikker på, at forholdene er i orden, og at reglerne overholdes. Reglerne på området er fortsat som i 2025, men der er lagt op til større bøder ved overtrædelser – dog først gældende fra 2027. I 2025 var der adskillige politianmeldelser, så myndighedernes fokus på området er næppe mindsket. Et godt råd er derfor, at er du selv i tvivl, så undlad at køre!

Overvejelser inden udbringning

Efter en relativ tør efterårs- og vinterperiode synes behovet for udbringning af husdyrgødning for mange, her hvor udbringning igen bliver tilladt i næste uge, ikke at være så akut, som vi har set flere gange i de senere år. Dog skal vi huske på, at selvom dagslængden er tiltaget væsentligt, har den sidste del af vinterperioden i februar og primo marts i de senere år ofte givet mere vintervej end december og januar. Derfor bør du overveje din gyllestrategi – opbevaringskapacitet kontra farbare arealer. Hvor meget gylle skal du udbringe nu, hvor der ikke er noget fagligt behov, for at du kan komme igennem den resterende periode, frem til det for alvor bliver forår? Udbringning først i februar bør dog altid begrænses til det absolut nødvendige, da afgrødernes udnyttelse af næringsstofferne, som tildeles i februar, langt fra er optimal, og risikoen for næringsstofftab ud af rodzonen derfor er tilsvarende stor. Husk blot på hvor stor nedbørsmængderne var i februar og marts 2024! Ved udbringning til årets majs- og roemarker bør der i alle tilfælde anvendes nitrifikationshæmmer; læs mere herom i artiklen 'Brug nitrifikationshæmmer ved tidlig gylleudbringning'.

Reglerne kort fortalt – flydende husdyrgødning

Reglerne for udbringning af husdyrgødning, andre organiske gødninger og mineralsk handelsgødning er fastsat i Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning (BEK nr. 931 af 16/07/2024), kapitel 2, hvor du kan læse de specifikke bestemmelser. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/931> I korte træk er det især nedennævnte forhold, du skal være opmærksom på i den kommende tid. Du er selvfølgelig til enhver tid selv ansvarlig for at overholde de bestemmelser, der gælder for netop dine arealer.

Miljø- og afstandskrav

1. Jorden er dækket af sne.
Jorden er pr. definition snedækket, hvis 90 % af marken er dækket af blot ½ cm sne.
2. Jorden er frosset.
Miljøstyrelsens definition for lovlig udbringning er, at jorden skal være optøet i mindst 15 cm's dybde; dog er det tilladt at køre efter nattefrost, hvis jorden forventes at optø til 15 cm's dybde i dagens løb.
Vær opmærksom på, at din tolkning af, hvorvidt jorden er optøet, kan være forskellig fra den tolkning kontrollører og kommuner anlægger. Du bør derfor sikre dig, at jorden er tilstrækkelig optøet ved at stikke med et jordspyd eller evt. ved at grave med en spade flere steder i marken OG dokumentere dette med et dateret billede heraf.
3. Jorden er vandmættet eller oversvømmet.
4. På skråninger med en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer > 100 m² eller fjorde, inden for en afstand af 20 m fra vandmiljøets øverste kant. På arealer med **hældning på 6 – 12°** må der dog nedfældes flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og flydende affaldsprodukter **parallelt med vandmiljøet**.
5. I en afstand af 20 meter til naturtyper omfattet af kategori 1-natur (ammoniakfølsomme naturtyper) og naturtyperne højmoser og lebeliesøer omfattet af kategori 2-natur skal *flydende husdyrgødning* nedfældes – alternativt kan der forsures.

Reglerne kort fortalt – fast husdyrgødning

Generelt må fast husdyrgødning ligeledes udbringes fra 1. februar på vintersæd og græsmarker, som skal ligge til produktion i 2026. Endvidere må udbringning ske på stubmarker og græsmarker, som skal lægges om i foråret; her skal nedbringning med plov eller kultiveringsredskaber som tand- og tallerkenharve ske inden fire timer, således at gødningen blandes helt med jord eller vendes ned under jordoverfladen.

Forbeholdene i punkterne 1-3 samt 5 oven for gælder også ved udbringning af fast husdyrgødning.

6) Pkt. 5 fortsat - *Fast husdyrgødning* skal nedbringes inden fire timer.

Vær opmærksom på, at der også for fast husdyrgødning gælder særlige regler for arealer med efterafgrøde i majsstub. I praksis betyder kravet om nedbringning inden fire timer, at fast husdyrgødning tidligst kan udbringes på pligtig, husdyr- eller målrettet efterafgrøde i majsstub fra 1. marts.

I tabel 2 nedenfor er vist et overblik over de generelle regler for udbringning af fast og flydende husdyrgødning.

Generelle begrænsninger og afstandskrav

Organisk gødning bortset fra ensilagesaft og restvand må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone- eller sommerhusområder eller i et område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Oversigt over lovlig udbringning af husdyrgødning pr. 1. februar / 1. marts

Reglerne for udbringning af husdyrgødning er et sammensurium af reguleringer i forskellige bekendtgørelser, som det ikke er let at få overblik over. I tabel 2 vises en samlet oversigt over de generelle regler vedr. udbringningstidspunkter aktuelt plantedække/afgrøde. Hvor der i tabellen henvises til "PLØJES", er fræsning eller gentagne harvninger i en dybde af 10-15 cm sidestillet med pløjning.

Vær især opmærksom på, at pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder i majsstub IKKE må destrueres før 1. marts. Det betyder i praksis at sortjordsnedfældning af gylle og udbringning af fast husdyrgødning ikke er lovlig i februar måned.

Tabel 2 Generelle regler. Oversigt over lovlig udbringning af flydende og fast husdyrgødning samt andre organiske gødninger pr. 1. februar / 1. marts. Se dog også tabel 3.

Afgrøde / efterafgrøde	Udbringning af husdyrgødning tilladt pr.
Stubmark UDEN efterafgrøde	1. februar
Stubmark MED efterafgrøde sået EFTER høst 2025	1. februar
Græsefterafgrøde efter KORN	1. februar
Græsefterafgrøde efter MAJS	1. marts *
Græsefterafgrøde med kvælstofkvote 2025. PLØJES forår 2026	1. februar
Græsmarker, omdrift og permanente. PLØJES forår 2026	1. februar
Græsmarker, omdrift og permanente. PLØJES IKKE forår 2026	1. februar
Vintersæd og vinterraps	1. februar

*) Se dog også tabel 3 vedr. udbringningsteknik.

Brug nitrifikationshæmmer ved tidlig gylleudbringning

Af planterådgiver Peter Siebert

Ved tidlig udbringning af gylle er der stor risiko for tab af kvælstof. Det kan anbefales at anvende nitrifikationshæmmer for at begrænse risikoen.

Der er pres på opbevaringskapaciteten

Overordnet set blev gyllelagrene tømt godt ned i sensommeren/efteråret og efterårs-vinterperioden har været blandt de mere nedbørsfattige, så aktuelt synes der ikke at være noget stort pres på lagerkapaciteten. Trods det skal der nok være enkelte bedrifter, hvor opbevaringskapaciteten er ved at være strakt til det yderste, så februar og ophør på lukkeperioden for udbringning af husdyrgødning imødeses med håb om snarligt tøvejr, så toppen kan tages af gylletankene.

Fra et fagligt synspunkt er det uønsket at udbringe gylle allerede i starten af februar. Udnyttelsen af næringsstoffer sker først, når plantevæksten er kommet i gang hen i marts med stigende dagslængde og højere temperaturer. For vårafgrøder, der først etableres senere på foråret, er der også stor risiko for tab af kvælstof til udvaskning ved udbringning nu.

Uagtet at det fagligt set ikke er ønskeligt at bringe gylle ud i starten af februar måned, vil adskillige alt andet lige være nødsaget til at udbringe gylle, inden det fagligt kan anbefales. Dette bør give anledning til overvejelser om, hvorvidt opbevaringskapaciteten nu også er stor nok. Udover at være presset i foråret på at få kørt gylle ud tidligt, er det ikke ualmindeligt at lagrene også skal tømmes på græsmarkerne i sensommeren for at skabe sikkerhed for, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig indtil foråret. Husk på, at den lovpligtige opbevaringskapacitet er på ni måneder af en årsproduktion, hvilket nogle ikke kan overholde, hvis det er nødvendigt at udbringe gylle såvel i sensommeren som i det tidlige forår. Med den nye kvælstofregulering fra januar 2027 øges kravet til lagerkapacitet for langt de fleste, fordi udbringning af husdyrgødning efter 1. august i realiteten ikke bliver muligt.

Samlet peger dette på, at opbevaringskapaciteten skal øges. Kun ved at have tilstrækkelig stor opbevaringskapacitet vil du såvel kunne servicere dine gyllemodtagere som have tilstrækkelig gylle til dine egne marker på de fagligt set optimale tidspunkter.

Anvend nitrifikationshæmmer

Ved udbringning af gylle meget tidligt, inden plantevæksten og optaget af næringsstofferne begynder, er der risiko for, at der sker en udvaskning af kvælstof, hvis vi kommer ind i en periode med overskudsnedbør. I det tidligere forår er jorden ofte helt vandmættet, og derfor skal der kun mindre mængder nedbør til, før der sker afstrømning. Kvælstof udvaskes, når det er omdannet til nitrat. Kvælstof i gylle, der udbringes i starten af februar, har en høj risiko for at blive udvasket, da perioden, frem til plantevæksten begynder, er lang, og der indtræffer næsten altid en periode med overskudsnedbør i den sidste del af vinteren/tidlige forår. Ved at anvende nitrifikationshæmmer ved gylleudbringning, hæmmes de mikroorganismer i jorden, som omdanner ammonium-kvælstof til nitrat-kvælstof. Dermed udvaskes kvælstoffet i gyllen ikke lige så hurtigt, da det primært er nitrat-kvælstof, som har stort udvaskningspotentiale.

De officielle anbefalinger vedrørende brug af nitrifikationshæmmer er, at de primært skal anvendes i rækkeafgrøder, som har en langsom etablering. Imidlertid vil vi udvide anbefalingen til flg.:

- Græsmarker, vårsæd, korn og blandsæd

- Februar måned, meget tidlig udbringning af gylle
- **Majs og foderroer - ALTID**
 - Februar til medio april

Der er ikke nogen landsforsøg med tidlig udbringning af gylle til græsmarker i kombination med/uden nitrifikationshæmmere. Derfor er det udelukkende en anbefaling, som beror på et fagligt skøn, at det ved meget tidlig udbringning af gylle i februar måned, inden plantevæksten rigtig begynder, vil være en forsikring mod tab af kvælstof at bruge nitrifikationshæmmer i gylle til græs.

Der findes flere forskellige nitrifikationshæmmere på markedet. De mest anvendte i Danmark er Vizura og Instinct. Der er kun lille forskel i effekten mellem de to nitrifikationshæmmere, og omkostningen ved brug af produkterne er også på samme niveau – omkring 150-200 kr. pr. hektar ved de normalt anvendte doser; læs produktetiketterne for nærmere information. Doseringen er uafhængig af gyllemængden, da effekten af produkterne sker i jorden og ikke på gyllen. Der skal bruges hhv. 2,0 liter Vizura og 1,7 liter Instinct pr. hektar. Ved placering af gylle f.eks. forud for majssåning anbefales mindre mængder, hhv. 1,0 L Vizura og 1,0 L Instinct pr. ha. Begge produkter kan også udsprøjtes i minimum 100 liter vand pr. hektar f.eks. sammen med glyphosatprodukter ved nedvisning af græsmarker eller efterafgrøder som alternativ til iblanding under gylleudbringning. Effekten af produkterne aftager efter 4-6 uger med den længste effekt under kølige forhold. Nitrifikationshæmmere kan endvidere reducere udslippet af lattergas fra jorden til atmosfæren, hvorved der også opnås en klimaeffekt.

I 2025 har der ikke været Landsforsøg med nitrifikationshæmmere i majs, men i 2024 har der været to Landsforsøg; et forsøg i Holstebro og et i Varde. Gyllen blev kørt ud hhv. den 25. april og den 13. april. I forsøget i Varde var der ingen merudbytte for brug af nitrifikationshæmmer og i beretningen fra Landsforsøgene er et bud på forklaringen et højere indhold af ler i jorden med en lerprocent på 7,3 procent. Generelt var udbytteneiveauet noget højere i Varde. I forsøget i Holstebro var der merudbytter på 1.490 FEN/ha og 2.480 FEN/ha for hhv. Vizura og Instinct. I dette ene forsøg var Instinct også med sikkerhed bedre end Vizura. Generelt er det noget højere medudbytter, end hvad vi tidligere har set i Landsforsøgene, men det skal dog også tages i betragtning, at det kun er i ét forsøg i 2024.

Om effekten havde været større ved tidligere udbringning af gylle, er jeg ikke nødvendigvis sikker på, da 2024 sæsonen var så ekstrem, og at nedbørsoverskuddet fortsatte langt ind i sommerhalvåret. Da nitrifikationshæmmere kun virker i en begrænset periode, kan effekten derfor eventuelt nå at fortage sig, inden plantevæksten går i gang i ekstreme år som 2024, ved udbringning meget tidligt. Det så vi for eksempel i et andet forsøg i 2024 med forskellige kombinationer af nedfældet og placeret gylle på forskellige tidspunkter og med stigende mængder kvælstof. Vi omtalte resultater herfra i **TILVÆKST Grovfoder nr. 2, 2024**. Her blev der i alle led brugt nitrifikationshæmmer, og på trods af det var der en udbytteeffekt af at vente med udbringning af gylle til april måned kontra marts måned.

Forhør dig hos din planterådgiver eller din lokale maskinstation om mulighederne, hvis du ønsker at forsikre dig mod tab af kvælstof ved tidlig gylleudbringning. Anvendelse af nitrifikationshæmmer er én af de sjældne forsikringer, som betaler sig i de fleste tilfælde.

Pas på dig selv og dine medarbejdere

Vær opmærksom på sikkerheden ved håndtering af Vizura, som har en meget lav pH-værdi (pH: 0,5-1) svarende til en meget stærk syre. Vizura bør derfor kun anvendes i automatiske doseringsanlæg på gyllevognen.

På nedenstående banner kan du se etikette og sikkerhedsdatablad for Vizura og Instinct. Læs og instruer dine medarbejdere grundigt i sikkerhedsforskrifterne ved håndtering af Vizura. Ligeledes gælder mange af de samme retningslinjer for Instinct, som deler mange af faresymbolerne, som også fremgår på etiketten for Vizura.

REGLER OG TILSKUD

Fjernelse af læhegn eller andet i det åbne landskab

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Der bliver fjernet en del læhegn og det kan der være mange gode grunde til. Kontakt dog kommunen før du begynder, da de nogle gange anderledes på om disse må fjernes, inden du ændrer noget i det åbne landskab.

Vigtigste frister for indsendelser i foråret 2026

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Den 31. marts skal alle gødningsregnskaber, sprøjtejournaler og IPM-skemaer være indsendt. For at du kan nå at udfylde IPM-skema rettidigt, skal din sprøjtejournal være indsendt. Begge dele kan klares umiddelbart lige efter hinanden.

Her den 2. februar åbnede ansøgningsrunden 2026 for Fællesskemaer. De vil nu så småt blive indsendt i takt med at styrelsen får systemet til at virke hele vejen rundt. Ansøgningsfristen er i år d. 22. april. Vær opmærksom på at tilskud til målrettede efterafgrøder og permanent ekstensivering skal være indsendt senest d. 22. april.

Frem til d. 18. maj kan der indsendes ændringer til ansøgningen.

Flydende husdyrgødning – regler, teknik og forsuring

Af planterådgiverne Vivi Ernsten og Thomas Harbo

Vær opmærksom på de mange særlige regler, der gælder for udbringningsteknik ved udbringning af flydende husdyrgødning i februar.

Regler og teknik

Reglerne for hvilke udbringningsteknikker, og på hvilke tidspunkter disse generelt må anvendes, kan være svære at navigere i. I tabel 3 vises en detaljeret oversigt over lovlige udbringningsmetoder i februar.

Tabel 3 Almindelige harmonikrav, udbringningsteknik ved flydende husdyrgødning i februar 2026.

Teknik/gylletype	Almindelige harmonikrav						
	Pligtig- og målrettet efterafgrøde 2025, efter		"Ren" korn- og majsstubb Vårsæd		Græsmarker (omdrift og permanente), pløjes forår 2026	Græsmarker (omdrift og permanente), pløjes IKKE forår 2026	Udlæg af græs og kløvergræs, udlagt i dæksæd 2025 (græsmark 2026)
	Korn	Majs	Inden såning	Efter såning			
Græsmarksnedfælder	✓	✓	✗		✗	✓	✓
Slæbesko/Slangeudlægning, gylle FORSURET	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓
Slæbesko/Slangeudlægning, gylle IKKE FORSURET	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Slæbesko/Slangeudlægning, væskefraktion IKKE FORSURET	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
Sortjordsnedfælder	✓	✗ ³⁾	✓		✓		

1) Ved slangeudlægning af forsuret gylle inden såning, er der et krav om nedbringning hurtigst muligt og inden for fire timer.

2) Forudsat at kravene til maksimalt tørstofindhold er overholdt.

3) Sortjordsnedfældning i majsstubb med efterafgrøder er lovligt fra 1. marts.

De specifikke krav til dokumentation for forsuring af gylle ved godkendte forsuringsteknikker fremgår af tabel 4 nedenfor.

For at opnå den bedste effekt af forsuret slangeudlagt gylle, skal slæbeslangerne, som navnet også siger, slæbes hen ad jorden, ligesom det gælder, at slæbesko skal være i kontakt med jorden. Gødningen skal lægges ud på jordoverfladen. Når slangerne lægger gyllen ud på jorden, mindskes gylleoverfladen på jorden, ammoniakfordampningen begrænses, og kvælstofeffekten øges. Aarhus Universitet har udført forsøg, der viser, at ammoniakfordampningen kan reduceres med 25-30 % ved at slæbe slangerne i forhold til, hvor slangerne er hævet 20 cm over jordoverfladen. Effekten er størst under varme og tørre forhold. I forsøgene er der udbragt 120 kg NH₄-N pr. ha, svarende til omkring 45 ton/ha

kvæggylle. Omregnet til forbedret kvælstofeffekt svarer det til 5-8 kg N pr. ha. Forsøgene er udført i vårbyg og vinterhvede, men det er dog ikke opgjort, hvorvidt der er effekt på udbyttet.

Forsuring og separering

Til sæsonen 2022 blev kravene til forsuret gylle ændret fra et pH-krav til et krav om anvendt mængde svovlsyre. Disse regler er stadig gældende.

Tabel 4 Krav til mængde 96 % svovlsyre til forsuring af gylle

Gylletype	Markforsuring, samt tankforsuring, hvor gyllen udbringes senest 72 timer efter forsuring		Tankforsuring, hvor gyllen udbringes 3-28 dage efter forsuring. Kun tilladt i perioden 1. september til 1. april	
	[kg/tons]	[L/tons]	[kg/tons]	[L/tons]
Kvæggylle, ikke afgasset	3,0	1,6	4,4	2,4
Svinegylle, ikke afgasset	2,9	1,6	5,7	3,1
Afgasset gylle, samt andre gylletyper ¹⁾	11,0	6,0	14,0	7,6

1) I praksis er det ikke muligt at anvende så store syremængder pga. skumdannelse.

Kravene til svovlsyremængden er sat med udgangspunkt i 96 % koncentreret svovlsyre. Anvender du en mindre koncentreret svovlsyre, skal mængden omregnes og øges forholdsmæssigt efter indholdet i det aktuelle produkt.

Væskefraktion fra separeret kvæggylle må udbringes uden nedfældning og forsuring, forudsat at tørstofindholdet ikke overstiger 3,9 procent. Væskefraktion fra svinegylle og afgasset gylle må ligeledes udbringes uden nedfældning og forsuring, hvis tørstofindholdet ikke overstiger 3,6 procent.

Når der anvendes forsuret gylle på bedriften, skal der foreligge dokumentation for, at reglerne er overholdt. Dokumentationen skal indeholde en erklæring om tidspunktet for udbringning, omfanget af udbringningsarealerne og den udbragte mængde gylle samt den anvendte mængde syre. Erklæringen kan f.eks. være et notat om dato, udbringningsmetode, gyllemængde mv. i en markbog, eller ved en registrering af udbringningen i et elektronisk program som f.eks. FarmTracking.

Derudover skal der foreligge dokumentation i én af de følgende dokumentationstyper; se tabel 5 nedenfor. Dokumentationen skal opbevares i op til fem år og fremvises til kontrolmyndighed ved forlangende. Du kan finde myndighedernes forsuringsattest her, ligesom den oversigt over teknologi-specifikke krav, som myndighederne også har sammenfattet, ligeledes kan findes her.

Tabel 5 Krav til dokumentation ved udbringning af gylle med ammoniakreducerende teknologier og separering.

Dokumentationstype	Dokumentationsbehov
Dokumentation for nedfældning	Faktura fra maskinstation, internt regnskab fra markdriftsfællesskab eller logbog/erklæring om den foretagne nedfældning.
Dokumentation for forsuring i mark	Kvittering for indkøb af tilstrækkelig mængde syre.
Dokumentation for forsuring i lag	Kvittering for indkøb af tilstrækkelig mængde syre samt en forsuringsattest, der indeholder de nødvendige oplysninger om den gennemførte forsuring.
Dokumentation om forsuring i stalden	Dokumentation for at den krævede dokumentation i henhold til husdyrbrugets tilladelse eller godkendelse er overholdt.
Dokumentation for separering	Der skal sikres dokumentation for husdyrgødningens indhold af tørstof, total- og ammonium kvælstof før separering, og i den væskefraktion og fiberfraktion, der dannes efter separering. Prøven skal udtages repræsentativt. Analyserne skal udføres af et akkrediteret laboratorium.

ARRANGEMENTER OG KURSER

Aktuelle kurser

SAGRO afholder en lang række af opfølgningskurser for sprøjteførere og ADR-medarbejderkurser. Find dem på sagro.dk, hvor der også er andre spændende møder