



TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 9

Indhold

- **MARK**
- Aktuelt i marken
- Udbringning af gylle til vårsæd
- Vækstregulering
- Svampe i vintersæd
- Svampe og skadedyr i vinterraps
- **ARRANGEMENTER OG KURSER**
- Sprøjteopfølgingskursus

MARK

Aktuelt i marken

Af planterådgiver Henrik Otto Clement

Forårsarbejdet er godt i gang de fleste steder og selvom vejret indimellem driller lidt, så ser de kommende dage rimelige ud vejrsmæssigt. Tidligt sået vårbyg er allerede oppe.


Udbringning af gylle til vårsæd

Gylle til vårsæd giver det bedste udbytte, hvis det nedfældes før såning, fremfor slangeudbringning efter såning.


Mange marker kommer til at vente lidt endnu på at få udbragt gylle. Det giver overvejelser om, hvorvidt man skal vælge at nedfælde før såning eller udbringe efter såning. Det er altid vigtigt, at så når det kan lade sig gøre at lave et godt såbed.

Udnyttelsen af gyllen kan godt falde med 15-20% ved udlagt med slæbeslanger fremfor nedfældet før såning. Dette er meget afhængig af temperaturer og luftfugtighed.

For at undgå tab af N ved fordampning, kan såning udsættes uden væsentlig udbyttenedgang for havre til d. 10-15. april og en uge senere endnu for vårbyg til omkring den 18-23. april. Kan gyllenedfældning og såning ikke nås inden for disse datoer, bør slangeudbringning efter såning overvejes som alternativ. Se figur 1 og 2.



Figur 1 Gennemsnit af 10 forsøg i årene 2016-2018, udbytte i vårbyg i forhold til sådato. Kilde: SEGES.



Figur 2 Udbytte i havre i forhold til sådato. Kilde: SEGES.

Vækstregulering

Med let nattefrost og relativt lave dagtemperaturer, er det ikke optimalt at vækstregulere. For at få gode forhold til at vækstregulere, bør lunere vejr afventes.

Vinterrug og vinterbyg er mange steder i vækststadie 31-32 og skal for at få en god vækstregulering, vækstreguleres inden de passerer vækststadie 37, spidsen af faneblad synlig. Vinterhveden er omkring vækststadie 30, begyndende strækning af hovedskud.

For middelvalg se TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 7

Svampe i vintersæd

Vi finder lidt meldug, rust og skoldplet i vintersæden. Det er dog så lidt at det er for tidligt at tage svampemidler med. På billede 1 ses kraftige angreb af brunrust i vinterrug sidste år. I år er det en helt anden situation også vejrmæssigt.



Billede 1 Brunrust i vinterrug. (Foto: 11. marts 2025, Michael D. Fleng, SAGRO)

Svampe der sidder på de overvintrende blade, har ikke nogen betydning. Det er de nye blade der skal holdes øje med.

Svampe og skadedyr i vinterraps

Som det ser ud lige nu, vil en svampesprøjtning i vækststadie 65, fuld blomstring, være tilstrækkelig.

Når du sprøjter ved fuld blomstring, så brug gerne op til 400 l/ha vand og lav kørehastighed, for at nå helt ned i bunden af afgrøden. Smitten kommer fra jordoverfladen og gør skade der hvor kronbladene ligger sig på side stilkene.

Glimmerbøsser kan blive et problem i år, hvor vinterrapsen ikke er så langt fremme i udvikling, så følg udviklingen mellem glimmerbøsser og begyndende blomstring i marken. Glimmerbøsserne flyver ved temperaturer fra 12-15 °C som vi kan få de kommende dage.

Glimmerbøsserne kan gøre mest skade frem til de første blomster springer ud, hvor skadestærsklen på 10-12 glimmerbøsser pr. plante. Se billede 2.

Når marken først er i begyndende blomstring, hvor glimmerbøsserne ofte opholder sig inde i blomsterne, gør de ikke skade.



Billede 2 Glimmerbøsser i vinterraps, første blomst udsprunget. (Foto: Jens Peder Pedersen, SAGRO)

ARRANGEMENTER OG KURSER

Sprøjteopfølgningskursus

Er det tid til, at du eller én/flere af dine medarbejdere skal på sprøjteopfølgningskursus?

Se udbuddet **på siden her**, og klik ind på den ønskede dato for at komme til tilmeldingssiden.

Planlagte kurser:

- Onsdag den 20. maj på SAGRO i Billund

Der kommer selvfølgelig kurser igen til efteråret.