



## TILVÆKST Salgsafgrøder nr. 19

### Indhold

- **MARK**
- Aktuelt i marken
- Markplan 2027
- IPM-tip
- Præcision
- Vanding
- Arrangementer og kurser

### MARK

---

#### Aktuelt i marken

*Af planterådgiver Henrik Otto Clement, SAGRO*

#### Vinterhvede

Sidste svampesprøjtning foretages inden for ca. 8-10 dage. Kun lidt svampe, dog gulrust en del steder tilmed set på øverste blad.

Kornbladfluens larve kan mærkes i blade med et bleggrønt eller vissent udseende, hvis du stryger blade mellem to fingre. Typisk i den yderste tredjedel af bladet. Bekæmpelse ikke aktuel.

Fusarium kan bedst bekæmpes i vækststadiet 61-65 – anvend f.eks. Prosaro eller Proline Xpert EC 240 eller Orius Gold. Propulse må kun anvendes til vækststadiet 61.

#### Hestebønner

*Af planterådgiver Eva Tine Nissen Engelbreth, SAGRO*

Vårhestebønner er begyndt at blomstre. Det er nu der skal holdes øje med skadedyr og svampe.

Lige nu er der godt med vand i jorden, men husk at hestebønner kvitterer negativt for at mangle vand, især under blomstring, så kom i gang med at vande når vandhusholdningen bliver for lille.

#### Skadedyr

Bekæmpelsestærsklen for bededbladlus er 10-15 pct. planter med bladlus og begyndende kolonidannelse frem til fuld bælg længde. Ved behov for bladlusbekæmpelse anvendes 0,15-0,2 kg/ha Pirimor eller 0,2-0,25 kg/ha Lamdex.

Pirimor har bedst effekt og foretrækkes især ved kraftige angreb. Bemærk, at Pirimor kun må bruges 1 gang pr. vækstsæson.

#### Svampe

I de marker, hvor blomstringen er begyndt eller godt i gang, holdes øje med rust, chokoladeplet og hestebønnebladplet samt vikkeskimmel. Så snart de første svampe ses bør der behandles mod dette, ellers vil en behandling ved afsluttende blomstring omkring 1. juli, ved vækststadiet 65-69, være det bedste tidspunkt at bekæmpe svampene i hestebønnerne, jf. tabel 1.

I år ses allerede en del vikkeskimmel, dog er tidlig bekæmpelse kun aktuel ved meget udbredte angreb. 0,35 l Pictor Active er bedst, men med moderat effekt. Må anvendes fra vækststadiet 51, når de første knopper er synlige.

I vinterhestebønner ses chokoladeplet, se billede 1 og 2, så det kan også blive et problem i vårhestebønnerne. Se tabel 1 for bekæmpelse af sygdomme i hestebønner for middelvalg.

Rust optræder ofte relativt sent. Selv relativt sene angreb kan dog være tabsvoldende i hestebønner.



Billede 1 og 2: Vinterhestebønner ved Fåborg med chokoladeplet. Foto: Eva Tine Nissen Engelbreth

Bekæmpelse af svampesygdomme i hestebønner skønnes nødvendig ved omkring 5-10 procent angrebne planter.

Anvend omkring halv dosering. Der kan evt. også anvendes to behandlinger med 30-40 procent dosering med ca. 14 dages mellemrum omkring blomstring.

I et enkelt landsforsøg med meget højt smittetryk af chokoladeplet i 2020 gav Pictor Active det højeste nettomerudbytte.

I landsforsøgene har der været behandlet i stadium 61-65, begyndende blomstring til blomstring halvvejs som har været omkring 15. juni og behandlet ca. 2 uger senere omkring 1. juli. Især den sidste behandling ca. 2 uger efter

begyndende blomstring har bidraget til merudbyttet, så bekæmpelse skal ikke iværksættes for tidligt.

Angreb anbefales dog bekæmpet ved begyndende angreb. Ved angreb har der været god rentabilitet i bekæmpelse.

Tabel 1: Bekæmpelse af sygdomme i hestebønner. Kilde Middeldatabasen.dk

| Bekæmpelse af sygdomme i hestebønner |                        |                     |              |   |         |                                                          |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---|---------|----------------------------------------------------------|
| Markens                              | Indgængende            | Læsnings            | Dele pr. ha. | Ø | Pris    | Bemærkninger                                             |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-13 | Chlorose            | 1,5          | - | 300     | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)      |
| Chlorose                             | Algerens stadium 15    | Chlorose            | 0,3 - 0,4    | - | 270-300 | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)      |
| Chlorose                             | Algerens stadium 18    | Chlorose            | 0,3 - 0,4    | - | -       | 1) for behandling 100 ml/m² anvendes 10 ml/m² 75. Fenset |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-15 | Chlorose            | 0,5          | - | 225     | Algerens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)    |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-17 | Chlorose + Chlorose | 0,25 + 0,3   | - | 167     | 1) for behandling 100 ml/m² anvendes 10 ml/m² 75. Fenset |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-19 | Chlorose + Chlorose | 0,25 + 0,25  | - | 174     | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)      |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-17 | Chlorose + Chlorose | 0,25 + 0,25  | - | 185     | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)      |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-19 | Chlorose            | 0,5          | - | 123     | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 1)      |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-19 | Chlorose + Chlorose | 0,25 + 0,3   | - | 155     | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)      |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-19 | Chlorose + Chlorose | 0,25 + 0,25  | - | 143     | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)      |
| Chlorose                             | Algerens stadium 11-17 | Chlorose + Chlorose | 0,5          | - | 184     | Gedens 11 "vinter anvendelse" 100 ml/m² anvendes 2)      |

## Markplan 2027

Af planterådgiver Henrik Otto Clement, SAGRO

Hold fast i vintersæd og vinterraps i markplanen for 2027 – kontakt gerne din planterådgiver, for at få vurderet hvordan det ser ud på din bedrift.

## IPM-tip

Gå dine marker igennem og af lug evt. ukrudtsarter der er få af og som du ikke ønsker skal sprede sig i dine marker. Det kunne være:

- Gråbynke – må nedvisnes før høst. Husk foto i Landbrugsstyrelsens app, jordbrugsfoto.
- Hanespore
- Grøn skærmaks
- Gold Hejre
- Flyvehavre – pligtig at bortluge
- Italiensk rajgræs

Er der mere end der kan bortluges, kan en afslåning være aktuel, hvis der er tale om mindre områder.

## Præcision

Husk at have styr på dine "as Applied" filer til marker tilmeldt præcision.

## Vanding

Der kan holdes pause generelt set, men hold øje med mængden af nedbør lokalt på dine marker.

## Arrangementer og kurser

Så er det tid til to store arrangementer i forsøgsmarkene ved Årre, med temaet kalkning og jordbearbejdning, og Ytteborg, med temaet vanding og hvad dertil hører.

ÅRRE - Sortsaften med fokus på kalkning og jordbearbejdning  
Mandag d. 15. juni kl. 19.00. Klik her for mere info.

HJERM - Planteaften på Ytteborg  
Tirsdag d. 16. juni kl. 18.30. Klik her for mere info.

BILLUND - Sprøjteopfølgingskursus  
Torsdag d. 18. juni. Klik her for mere info og tilmelding.